Gintarinė vaistinė

IKI -30%

PREPARATAMS IMUNITETUI IR PERŠALIMUI

Pasiūlymas galioja **2021 01 01 - 2021 01 31**, perkant vaistinėje, pateikus šias korteles: MYLIMIAUSIA, GINTARINĖ arba IKI PREMIJA. Nuolaidos nesumuojamos ir netaikomos kitų akcijų prekėms. Nuolaida taikoma prekėms, įtrauktoms į UAB „Gintarinė vaistinė“ administracijos patvirtintą prekių sąrašą. UAB „Gintarinė vaistinė“ pasilieka teisę bet kada keisti akcijos sąlygas. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.

SAUSIS
2021

AMBIO produktai

-30%
~~8,48 €~~
5,94 €

AMBIO SACHETS FOR HOT HERBAL DRINK

20 paketėlių

MAISTO PAPILDAS

Aviečių skonio tirpūs miltelliai su pelargonijų šaknų ekstraktu karštajam gėrimui, su saldikliais.

-20%
~~5,98 €~~
4,79 €

Atnaujinta pakuotė

AMBIO GERKLEI SU ŠALTALANKIŲ IR MEDETKŲ ALIEJAIS 20ml

SKYSTASIS MAISTO PAPILDAS

Levandinis šalavijas ir vaistinės medetkos padeda palaikyti kvėpavimo takų funkciją. Dygliuotasis šaltalankis ir kvapusis rozmarinas padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą.

-35%
~~5,98 €~~
3,89 €

AMBIO MULTIVITAMINŲ KOMPLEKSAS

60 tablečių

MAISTO PAPILDAI

-30%
~~4,98 €~~
3,49 €

AMBIO ANTIOKSIDANTAS

30 kapsulių

MAISTO PAPILDAS

Vitaminas A ir cinkas padeda išsaugoti normalų regėjimą. Vitaminas C, Vitaminas E, cinkas ir selenas padeda apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės pažaidos.

-40%
~~5,89 €~~
3,53 €

AMBIO KRAMTOMASIS KALCIS

30 tablečių

MAISTO PAPILDAS

Su saldikliu
Kalcis + Vitaminas D_3
Kalcis padeda palaikyti normalią raumenų veiklą. Taip pat yra reikalingas normaliai kaulų ir dantų būklei palaikyti.
Vitaminas D_3 padeda palaikyti normalų kalcio įsisavinimą.
Vitaminas D_3 padeda palaikyti normalią dantų, kaulų, raumenų ir dantenų būklę.

-30%
~~4,58 €~~
3,21 €

AMBIO VITAMINAS D VAIKAMS

20 kramtomųjų tablečių

MAISTO PAPILDAS SU SALDIKLIU

Vitaminas D_3 padeda palaikyti normalų kalcio ir fosforo įsisavinimą, normalią imuninės sistemos veiklą, normalią dantų, kaulų, raumenų būklę.

Nuolaidos galioja su vaistinės lojalumo kortelėmis.

-35%
~~3,99 €~~
2,59 €

AMBIO LIEKNĖJIMUI
30 tablečių
MAISTO PAPILDAS
FERMENTŲ IR AUGALINIŲ EKSTRAKTŲ KOMPLEKSAS
Chromas padeda palaikyti normalią maistinių makromedžiagų apykaitą.

-40%
~~7,49 €~~
4,49 €

AMBIO CHROMAS
60 tablečių
MAISTO PAPILDAS
200 µg chromo 1 tabletėje. Maisto papildo sudėtyje esantis chromas padeda palaikyti normalią maistinių makromedžiagų apykaitą bei normalią gliukozės koncentraciją kraujyje.

-50%
~~13,98 €~~
6,99 €

AMBIO KRILIŲ ALIEJUS
30 kapsulių
MAISTO PAPILDAS
500 mg krilių aliejaus vienoje kapsulėje
Sudėtyje yra vėžiagyvių ir gali būti žuvies pėdsakų. Laikyti ne aukštesnėje kaip 25 °C temperatūroje, vaikams nepasiekiamoje vietoje.

-45%
~~11,99 €~~
6,59 €

AMBIO RYKLIŲ TAUKAI
500 mg, 60 kapsulių
MAISTO PAPILDAS
500 mg ryklių taukų vienoje kapsulėje.

-35%
~~2,99 €~~
1,94 €

Atnaujinta pakuotė

AMBIO LAXATIVE COMPLEX
10 kapsulių
MAISTO PAPILDAS
Trūkažolės padeda palaikyti normalią kepenų ir žarnyno veiklą. Tikrasis margainis padeda palaikyti normalią kepenų funkciją ir normalią kepenų ląstelių būklę. Imbieras padeda palaikyti normalią virškinamojo trakto funkciją.

-30%
~~5,49 €~~
3,84 €

AMBIO AKIMS 30 kapsulių
MAISTO PAPILDAS
Maisto papildo sudėtyje yra vitaminų, mineralų ir liuteino. Vitaminas A ir cinkas padeda išsaugoti normalų regėjimą.

SUPER PASIŪLYMAI

NUO **3,99 €**

COLDREX

COLDREX, 500 mg/25 mg/5 mg/20 mg/30 mg, 12 tabletių 3,99 €
COLDREX, 500 mg/25 mg/5 mg/20 mg/30 mg, 24 tabletės 5,99 €

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Kiekvienoje tabletėje yra 500 mg paracetamolio, 25 mg kofeino, 5 mg fenilefrino hidrochlorido, 20 mg terpinhidrato, 30 mg askorbo rūgšties.
Terapinės indikacijos. Peršalimo ir gripo simptomų lengvinimas.
Vartojimo būdas. Dozavimas. Suaugusiesiems (įskaitant senyvo amžiaus) ir 16 metų bei vyresniems paaugliams, kurių svoris didesnis nei 54 kg: gerti po 2 tabletes kas 4-6 val. Didžiausia paros dozė yra 8 tabletės per 24 valandas. 12-16 metų paaugliams, kurių kūno svoris 43–54 kg: po 1 tabletę kas 4–6 valandas, jei reikia. Didžiausia paros dozė: 4 tabletės per 24 val. Nevartokite dažniau nei kas 4 valandas. Negalima viršyti nurodytos dozės. Vartokite tabletes užsigėrdami vandeniu.
Specialūs įspėjimai. Nevartokite kartu jokių kitų vaistų nuo kosulio ar peršalimo, gripo, nosies gleivinės paburkimo ar užgulusios nosies. Per didelės paracetamolio dozės gali sukelti sunkų kepenų pažeidimą. Vaisto vartojimo metu nevartokite alkoholinių gėrimų, kitų produktų, kuriuose yra kofeino. Pasitarkite su gydytoju, prieš pradėdami vartoti šį vaistą, jeigu: padidėjusi prostata arba Jums sunku šlapintis; sergate kraujagyslių liga, vadinama Raynaud; sergate inkstų liga; yra lėtinis mitybos nepakankamumas; reguliariai vartojate alkoholį; sergate Žilbero sindromu; vartojate kitų vaistų, kurie veikia kepenų funkciją; Jums trūksta fermento gliukozės 6-fosfato dehidrogenazės; sergate hemolizine anemija; yra dehidratacija; esate senyvo amžiaus, suaugęs ar vyresnis nei 16 metų paauglys, kurio kūno svoris mažesnis nei 54 kg; yra šlapimo susilaikymas ar šlapimo takų akmenys; sergate astma arba Jums yra padidėjęs jautrumas acetilsalicilo rūgščiai, pasireiškiantis bronchų spazmu; sergate sunkia infekcine liga, nes gali padidėti metabolinės acidozės rizika.
Kontraindikacijos. Vaisto artoti negalima jeigu: yra alergija veikliosioms arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai; padidėjęs kraujo spaudimas; padidėjęs skydliaukės aktyvumas; sergate cukriniu diabetu, širdies liga, uždaro kampo glaukoma, feochromocitoma, kepenų ar sunkia inkstų liga, esate neščia ar žindote kūdikį, vartojate vaistų, mažinančių nosies paburkimą, slopinančių apetitą, vaistų nuo peršalimo ar apetitą didinančių vaistų, vartojate tokius vaistus depresijai gydyti kaip triciklius antidepresantus, betablokatorius arba monoaminooksidazės inhibitorius (MAOI) bei dvi savaites po MAOI vartojimo; jaunesniems kaip 12 metų vaikams ar 12 metų ir vyresniems vaikams ir paaugliams, kurių kūno svoris yra mažesnis nei 43 kg.
Reklamos teksto parengimo data: 2020-10-16.

NUO **3,99 €**

COLDREX HOTREM

COLDREX HOTREM LEMON 750 mg/10 mg/60 mg miltelių geriamajam tirpalui, N5 3,99 €
COLDREX HOTREM LEMON 750 mg/10 mg/60 mg miltelių geriamajam tirpalui, N10 5,99 €
COLDREX HOTREM HONEY & LEMON 750 mg/10 mg/60 mg miltelių geriamajam tirpalui, N10 5,99 €

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Terapinės indikacijos. Trumpalaikis peršalimo ir gripo simptomų (karščiavimo, slogos ir skausmo) lengvinimas.
Vartojimo būdas. Dozavimas. Suaugusiesiems (įskaitant senyvo amžiaus) ir 16 metų bei vyresniems paaugliams, kurių svoris didesnis nei 54 kg: rekomenduojama dozė yra 1 paketėlis kas 4–6 valandas, jei reikia. Nevartokite daugiau kaip 5 paketėlių per parą. Nevartokite dažniau nei kas 4 valandas. Negalima viršyti nurodytos dozės. Subertį vieno paketėlio turinį į stiklinę ar puodelį, pripilti karšto vandens ir gerai išmaišyti. Jei reikia, įpilti šalto vandens. **Specialūs įspėjimai.** Nevartokite kartu jokių kitų vaistų, kurių sudėtyje yra paracetamolio, ar vaistų nuo kosulio ar peršalimo, gripo ir nosies gleivinės paburkimo ar užgulusios nosies. Per didelės paracetamolio dozės gali sukelti sunkų kepenų pažeidimą. Pasitarkite su gydytoju, prieš pradėdami vartoti jeigu: padidėjusi prostata arba Jums sunku šlapintis; sergate kraujagyslių liga, vadinama Raynaud fenomenu, inkstų liga, Žilbero sindromu, hemolizine anemija, sunkia infekcine liga, nes gali padidėti metabolinės acidozės rizika, astma arba Jums yra padidėjęs jautrumas acetilsalicilo rūgščiai, pasireiškiantis bronchų spazmu; yra lėtinis mitybos nepakankamumas; reguliarai vartojate alkoholį; vartojate kitų vaistų, kurie veikia kepenų funkciją; Jums trūksta fermento gliukozės 6-fosfato dehidrogenazės; yra dehidratacija; esate senyvo amžiaus, suaugęs ar paauglys, kurio kūno svoris mažesnis nei 54 kg; yra šlapimo susilaikymas ar šlapimo takų akmenys. **Kontraindikacijos**. Vaisto vartoti negalima jeigu: yra alergija veikliosioms arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai; padidėjęs kraujo spaudimas, skydliaukės aktyvumas; sergate cukriniu diabetu, širdies liga, uždaro kampo glaukoma, feochromocitoma, kepenų ar sunkia inkstų liga; esate neščia ar žindote kūdikį; vartojate vaistų, mažinančių nosies paburkimą, slopinančių apetitą, vaistų nuo peršalimo ar apetitą didinančių vaistų; vartojate tokius vaistus depresijai gydyti kaip triciklius antidepresantus, betablokatorius arba monoaminooksidazės inhibitorius (MAOI) bei dvi savaites po MAOI vartojimo; jaunesniems kaip 16 metų vaikams ir paaugliams. **Reklamos teksto parengimo data** 2020-10-16

STIPRESNIS NEI PERŠALIMAS IR GRIPAS!

7,99 €

SKAUDANČIAI GERKLEI

POLOVOX 8,75 MG/DOZĖJE

burnos gleivinės purškalas (tirpalas) 15ml

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Sudėtis: Vienoje dozėje (3 išpurškimuose) yra 8,75 mg flurbiprofeno. **Indikacijos:** skaudančios gerklės simptomų, tokių kaip gerklės skausmas, skausmingumas, sunkumas nuryti ir patinimas, trumpalaikiam malšinimui 18 metų ir vyresniems suaugusiesiems. **Dozavimas ir vartojimo metodas.** Suaugusieji nuo 18 metų ir vyresni: viena dozė (3 išpurškimai) į gerklę kas 3-6 valandas, bet ne daugiau kaip 5 dozių per 24 valandas. Per įpurškimą neįkvėpti. PoloVox skirtas vartoti tik trumpą laiką. **Kontraindikacijos.** PoloVox vartoti negalima pacientams, kuriems: yra alergija (padidėjęs jautrumas) flurbiprofenui, ar kitiems nesteroidiniams vaistams nuo uždegimo, arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai; anksčiau buvo pasireiškę alerginės reakcijos, pavartojus nesteroidinių vaistų nuo uždegimo ar aspirino; yra arba buvo du ar daugiau skrandžio opos arba kraujavimo arba žarnų opos atvejų; anksčiau po nesteroidinių vaistų nuo uždegimo vartojimo pasireiškė kraujo krešėjimo arba kraujavimo sutrikimų; jeigu yra sunkių širdies, inkstų ar kepenų sutrikimų; paskutiniai 3 nėštumo mėnesiai. Šio vaisto negalima vartoti vaikams ir jaunesniems kaip 18 metų paaugliams. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės.** Vartojant mažiausią veiksmingą vaistinio preparato dozę trumpiausią simptomų kontrolei būtiną laiką, galima sumažinti nepageidaujamus poveikius. Pasitarti su gydytoju arba vaistininku, prieš pradedant vartoti PoloVox: jeigu jau yra vartojamas bet kuris kitas nesteroidinis vaistas nuo uždegimo ar aspirinas; jei yra bakterinis tonzilių uždegimas; jeigu pacientas senyvo amžiaus; jeigu pacientas serga arba sirgo astma; sistemine raudonaja vilklige ar mišria jungiamojo audinio liga, hipertenzija, žarnyno ligomis (opinis kolitas, Krono liga); jeigu yra širdies, inkstų ar kepenų funkcijos sutrikimų; pacientė neščia pirmuosius 6 mėnesius arba maitina krūtimi. Reklamos teksto parengimo data- 2020 m. 07 mėn.



14,99 €

PATOGI DOZĖ. TIK VIENA TABLETĖ PER PARĄ

KOJŲ VENOMS

VELIOS 1000 mg, 30 plėvele dengtų tablečių

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Veikliojі medžiaga: kiekvienoje plėvele dengtoje tabletėje yra **1000 mg** mikronizuoto diosmino. **Indikacijos:** suaugusiųjų lėtinio venininės kraujotakos nepakankamumo simptomų (kojų sunkumo, kojų skausmo, naktinio kojų mėšlungio) lengvinimas. Suaugusiųjų paūmėjusio hemorojaus simptomų lengvinimas. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** lėtinio venininės kraujotakos nepakankamumo simptominiam gydymui **1 tabletė per parą** valgio metu. Paūmėjus hemorojui, pirmąsias 4 dienas gerti 3 tabletes per parą, 3 vėlesnes dienas – po 2 tabletes per parą. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas bet kuriai sudedamajai tabletės „VELIOS" medžiagai. **Spec. įspėjimai:** paūmėjus hemorojaus simptomams, reikia prisiminti, kad „VELIOS" veikia tik simptomus ir turi būti vartojamas trumpai. Jei simptomai nepraeina, reikia atlikti proktologinį tyrimą ir parinkti tinkamą gydymą. „VELIOS" gydomąjį poveikį gali sustiprinti saulės bei ilgalaikio stovėjimo vengimas, tinkamo kūno svorio palaikymas, specialių kojinių nešiojimas. Šio vaisto negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas retas paveldimas sutrikimas – galaktozės netoleravimas, visiškas laktazės stygius arba gliukozės ir galaktozės malabsorbcija. „VELIOS" sudėtyje yra saulėlydžio geltonojo dažalo (E110), kuris gali sukelti alerginių reakcijų. Teksto parengimo data 2020 06 10. VEL-LT2006-20

PAJUSK KOJŲ LENGVUMĄ.

-30 %

IR GINTARINE.LT

AKIMS DRĖKINTI

HYAL-DROP® MULTI, 10 ml

MEDICINOS PRIEMONĖ

Hyal-Drop® multi skirtas išsausėjusioms ir sudirgusioms akims drėkinti. Sudėtyje esantis natrio hialuronatas – tai natūralus drėkiklis, palengvinantis tokius simptomus, kaip sudirgusios, pavargusios, išsausėjusios, ašarojančios, tarsi smėlio pripiltos akys. Hyal-Drop® multi tinka nešiojantiems kontaktinius lęšius. Dėka pažangios dozavimo sistemos, Hyal-Drop® multi sudėtyje nėra konservantų, o preparatą galima vartoti net 6 mėnesius po atidarymo. HYA-LT2009-39

TARKITE „NE" SAUSOMS AKIMS!



3,99 €

NUO NOSIES UŽSIKIMŠIMO, GALVOS SKAUSMO IR KARŠČIAVIMO

IBUSIN, 200 mg/6,1 mg, 12 plėvele dengtų tablečių

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

1 dengtoje tabletėje yra 200 mg ibuprofeno ir 6,1 mg feniletrino hidrochlorido (atitinkančio 5 mg feniletrino). **Terapinės indikacijos:** trumpalaikiam peršalimo ar gripo simptomų, tokių kaip nosies ir (arba) sinusų gleivinės užburkimo ir užsikimšimo, lydimo galvos skausmo ir (arba) karščiavimo, lengvinimui. **Dozavimas ir vartojimo metodas.** Suaugusiesiems rekomenduojama vienkartinė dozė yra 2 tabletės. Ją reikia vartoti 3 kartus per parą (kas 8 valandas). Nevartokite daugiau kaip 6 tabletių per 24 valandas. Nurykite „Ibusin" tabletę visą, užgeriant vandeniu. Tabletės negalima kramtyti ar laužyti. **Kontraindikacijos:** alergija ibuprofenui, feniletrinui arba bet kuriai pagalbinei „Ibusin" medžiagai, alergija aspirinui arba kitiems nesteroidiniams vaistams nuo uždegimo, aktyvi arba ištinę pepsinė opa, kraujavimas, sunkus širdies, inkstų ar kepenų sutrikimas, paddėjęs kraujospūdis, cukrinis diabetas, uždaro kampo glaukoma, hipertirozė, padidėjusi prostata, hemoraginė diatezė, antiinkstų navikas, nediagnozuotas kraujo sutrikimas; jei vartojate triciklių antidepresantų arba monoaminooksidazės inhibitorių („Maoi"), bei dvi savaites po „Maoi" vartojimo nutraukimo. Negalima vartoti jaunesniems nei 18 metų vaikams ar paaugliams, nėščiosioms ar maitinančioms krūtimi moterims. **Specialūs įspėjimai.** Pasitarkite su gydytoju arba vaistininku, jeigu esate senyvo amžiaus, jums yra raudonoji vilklige arba mišri jungiamojo audinio liga, virškinamojo trakto, kraujo, širdies, inkstų ar kepenų sutrikimai, astma arba alerginės ligos šiuo metu ar praeityje, kvėpavimo problemos, dehidratacija, vėjaraupiai, vartojate bet kokių kitų vaistų. Teksto parengimo data: 2020-02-05.

IBUSIN. KAI SLOGA TAMPA GALVOS SKAUSMU.

Nuolaidos galioja su vaistinės lojalumo kortelėmis.

SUPER PASIŪLYMAI

STREPSILS

Honey & Lemon 1,2 mg/0,6 mg, 24 kietosios pastilės
Vitamin C 1,2 mg/0,6 mg/100 mg, 24 kietosios pastilės
Menthol & Eucalyptus 1,2 mg/0,6 mg/8 mg, 24 kietosios pastilės

NUO **4,99 €**

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Kiekvienoje kietojoje pastilėje yra 1,2 mg 2,4-dichlorbenzilo alkoholio, 0,6 mg amilmetakrezolio, 100 mg askorbo rūgšties (Strepsils Vitamin C) ir 8 mg levomentolio (Strepsils Menthol&Eucalyptus). **Terapinės indikacijos:** lokalus simptominis ryklės uždegimo gydymas. **Dozavimas ir vartojimo metodas:** Strepsils Menthol&Eucalyptus: suaugusiesiems ir vyresniems kaip 12 metų vaikams leisti čiulpti po 1 pastilę kas 2-3 valandas, bet ne daugiau kaip 8 pastilės per 24 val. Strepsils Honey&Lemon, Strepsils Vitamin C: suaugusiesiems ir vyresniems kaip 6 metų vaikams čiulpti po 1 pastilę kas 2-3 valandas, bet ne daugiau kaip 8 pastilės per 24 val. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai. Jaunesniems nei 12 metų vaikams (Strepsils Menthol&Eucalyptus), Jaunesniems nei 6 metų vaikams (Strepsils Honey & Lemon ir Strepsils Vitamin C). **Specialūs įspėjimai:** dėl užspringimo pavojaus šių vaistinių preparatų nerekomenduojama vartoti mažiems vaikams. Atsargumo priemonių reikia cukriniu diabetu sergantiems pacientams, nes vienoje pastilėje yra 2,4 g cukraus ir 2,5 g cukraus (Strepsils Menthol&Eucalyptus). Šių vaistų negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas retas paveldimas sutrikimas – fruktozės netoleravimas, gliukozės ir galaktozės malabsorbcija arba sacharazės ir izomaltazės stygius. Strepsils Vitamin C sudėtyje yra azodažiklių - Ponso 4R (E124) ir saulėlydžio geltonojo (E110), kurie gali sukelti alerginių reakcijų.

STREPSILS INTENSIVE 8,75 mg, 16 ir 24 kietosios pastilės

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Kiekvienoje kietojoje pastilėje yra 8,75 mg flurbiprofeno. **Terapinė indikacija:** trumpalaikis simptominis gerklės skausmo gydymas suaugusiesiems ir vyresniems kaip 12 metų amžiaus vaikams. **Dozavimas ir vartojimo metodas:** suaugusiesiems ir vyresniems kaip 12 metų vaikams kas 3 6 valandas (kai reikia) leisti sučiulpti (leisti ištirpti burnoje) po vieną kietąją pastilę. Per 24 valandas galima suvartoti ne daugiau kaip 5 kietąsias pastilės. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai; anksčiau buvusios acetilsalicilo rūgšties ar kitų nesteroidinių vaistų nuo uždegimo (NVNU) sukeltos padidėjusio jautrumo reakcijos (pvz., astma, bronchų spazmas, rinitas, angioneurozinė edema ar dilgėlinė); yra ar anksčiau buvo peptinė opa ar kraujavimas iš opos (nustatyti du ar daugiau nesusijusių opaligės epizodų) bei žarnyno opos; anksčiau buvęs kraujavimas iš virškinamojo trakto ar jo perforacija, sunkus kolitas, kraujavimo ar kraujodaros sutrikimai, susije su ankstesniu NVNU vartojimu; paskutinis nėštumo trimestras; sunkus širdies, inkstų, kepenų nepakankamumas. **Specialūs įspėjimai:** vartoti atsargiai pacientams, kurie serga sisteminе raudonąja vilklige ir mišria jungiamojo audinio liga; serga tonzilitu (tonzilių uždegimu) ar mano, kad serga bakterijų sukelta gerklės infekcine liga; sirgo virškinimo trakto ligomis (pvz., opiniu kolitu, Krono liga); vartoti atsargiai neščiosioms pirmuosius 6 mėnesius ar žindyvėms; senyviems pacientams. Tokie vaistai gali būti susije su nedideliu širdies priepuolio (miokardo infarkto) ar insulto rizikos padidėjimu. Šio vaisto negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas retas paveldimas sutrikimas - fruktozės netoleravimas, gliukozės ir galaktozės malabsorbcija arba sacharazės ir izomaltazės stygius. Reklamos tekstas parengtas 2020-09-10.

NUO **2,49 €**

ŠIRDŽIAI IR KRAUJAGYSLĖMS

THROMBO ASS

THROMBO ASS 50 mg, 100 skrandyje neirių tablečių 2,49 €
THROMBO ASS 75 mg, 100 skrandyje neirių tablečių 2,75 €
THROMBO ASS 100 mg, 100 skrandyje neirių tablečių 2,99 €

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Veikliojі medžiaga: acetilsalicilo rūgštis.
Terapinės indikacijos: miokardo infarkto rizikos mažinimas sergantiesiems krūtinės angina. Antrinė miokardo infarkto profilaktika. Trombozės profilaktika po vainikinių arterijų nuosrūvio operacijos. Antrinė praeinančiojo smegenų išemijos priepuolio (PSIP) ar insulto profilaktika.
Vartojimo būdas ir dozavimas: vartoti po 1 tabletę 1 kartą per dieną (patariama vakare). Skrandyje neirių tablečių reikia nuryti nesukramtyta, užsigeriant pakankamu skysčio kiekiu valgio metu arba tarp valgymų tuo pačiu paros metu. Įprastinė paros dozė ilgalaikiam vartojimui yra 50–150 mg. Dalyti į dalis Thrombo ASS skrandyje neirios tablečės negalima, nes bus pažeista skrandyje neirl plėvelė. Norint, kad tiktu individualiam vartojimui, reikia rinktis atitinkamo stiprumo preparatą (50 mg, 75 mg ir 100 mg).
Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas veikliajai medžiagai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai bei salicilatams ir kitiems NVNU; bronchų spazmas; ūminė pepsinė opa; polinkis į kraujavimą, hemofilija; sunkus inkstų ar kepenų funkcijos nepakankamumas; sunkus, nepakankamai kontroliuojamas širdies nepakankamumas; nėštumas; vaikai ir paaugliai iki 16 metų.
Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės: Atsargumo reikia laikytis šiais atvejais: sergant bronchine astma, šienilige, esant nosies gleivinės paburkimui ir esant kito pobūdžio alergijai; vartojant kartu su vaistais, mažinančiais kraujo krešumą; sergant hemolizine anemija; esant skrandžio ir žarnų sutrikimams, esant anamnezėje duomenims apie opaligę ar kraujavimą iš virškinimo trakto; esant inkstų ligoms ir (arba) kepenų funkcijos sutrikimui; turintiems polinkį podagrai. Prieš numatytą operaciją 10 dienų acetilsalicilo rūgšties reikia nevartoti. Šio vaisto sudėtyje yra laktozės monohidrato, todėl vaisto negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas Lapp laktazės stygius arba gliukozės ir galaktozės malabsorbcija.
Pakuotė. **50 mg, 75 mg arba 100 mg; 100 skrandyje neirių tablečių.**
Rinkodaros teisės turėtojas ir gamintojas. G.L. Pharma GmbH, Schlossplatz 1, 8502 Lannach, Austrija.

2,99 €

NUO RĖMENS

PANZILAN® 20 mg,

14 skrandyje neirių tablečių

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Pantoprazolas. Vienoje tabletėje yra 20 mg pantoprazolo (pantoprazolo natrio druskos seskvihidrato pavidalu). **Indikacijos.** Panzilan sudėtyje yra veikliosios medžiagos pantoprazolo, kuri blokuoja skrandžio rūgštį gaminantį „siurblį", todėl skrandyje sumažėja rūgšties kiekis. Panzilan vartojamas trumpalaikiam gastroezofaginio refliukso simptomų (pvz., rėmens, rūgščių atpylimo) suaugusiems pacientams gydymui. Refliuksas yra rūgščių iš skrandžio atgalinis patekimas į stemplę, kurioje gali prasideti uždegimas ir sukelti skausmą. Dėl to gali atsirasti tokių simptomų, kaip skausmingas deginimo pojūtis krūtinėje kylantis iki ryklės (rėmuo) ir rūgštus skonis burnoje (rūgšties atpylimas). **Dozavimas ir vartojimo būdas.** Gerti po 1 tabletę per parą prieš valgį tuo pačiu paros laiku 2–3 dienas iš eilės, užsigeriant vandeniu. Tabletes reikia nuryti, negalima kramtyti ar laužyti. Neviršykite rekomenduojamos 20 mg pantoprazolo dozės per parą. Nutraukite Panzilan vartojimą, kai visai pranyks ligos simptomai. Nepasitarus su gydytoju vartoti Panzilan ilgiau kaip 4 savaites negalima. **Kontraindikacijos.** Jeigu yra alergija (padidėjęs jautrumas) pantoprazolui, soju lecitinui arba bet kuriai pagalbinei Panzilan medžiagai; kartu vartojami vaistai, kurių sudėtyje yra atazanaviro; amžius iki 18 metų; nėštumas arba küdikio žindymas. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės.** Jeigu dėl rėmens arba virškinimo sutrikimo gydotės ilgiau kaip 4 savaites; esate vyresnis kaip 55 metai ir kasdien vartojate nereceptinius vaistus dėl sutrikusio virškinimo; atsirado naujų simptomų arba simptomai neseniai pasikeitė; anksčiau sirgote skrandžio opalige arba buvo atlikta skrandžio operacija; sutrikusi kepenų veikla arba atsirado gelta; numatoma atlikti endoskopiją arba C-šlapalo mėginį. Jeigu numatyta atlikti kraujo mėginį, pasakykite gydytojui, kad vartojate šį vaistą. Atsiriūgimo ir rėmens simptomai gali palengvėti pavartojus Panzilan vos vieną dieną, tačiau šis vaistas neturi sukelti pagerėjimo nedelsiant. Jo negalima vartoti profilaktikai. Jei Jums gydytojas sake, kad netoleruojate kai kurių angliavandenių, prieš vartodami šį vaistą pasitarkite su gydytoju. Panzilan sudėtyje yra sojų lecitino. Jei esate alergiškas žemės riešutams ar sojai, vaisto vartoti negalima.

UŽGESINK GAISRĄ SKRANDYJE!

4,99 €

MEZYM 20000V 20 skrandyje neirių tablečių

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Vienoje skrandyje neirioje Mezym 10000V tabletėje yra 80–111,11 mg kiaulių kasos miltelių, kurių aktyvumas atitinka ne mažiau kaip: 10000 lipazės vienetų, 7500 amilazės vienetų, 375 proteazės vienetų pagal Europos farmakopėją.
Vienoje skrandyje neirioje Mezym 20000V tabletėje yra 160–222,22 mg kasos miltelių (iš kiaulių kasos pagaminto pankreatino), kurių minimalus aktyvumas atitinka 20000 lipazės vienetų, 12000 amilazės vienetų, 900 proteazės vienetų pagal Europos farmakopėją.
Indikacijos: MEZYM vartojamas tuomet, kai kasa nepakankamai gamina ir išskiria virškinimo fermentų ir tai sukelia virškinimo sutrikimų. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas (alergija) pankreatinui arba bet kuriai pagalbinei vaisto medžiagai. Ūminis arba paūmėjęs lėtinis kasos uždegimas, kol ligos požymiai yra stipriai išreikšti. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės:** Cistinė fibrozė kartais gali komplikuotis žarnyno nepraeinamumu. Esant simptomams, panašiems į žarnyno nepraeinamumo požymius, reikia įvertinti žarnyno susiaurėjimo susidarymo galimybę. MEZYM sudėtyje yra laktozės. Jeigu gydytojas yra sakęs, kad netoleruojate kokių nors angliavandenių, kreipkitės į jį prieš pradėdami vartoti šį vaistą. MEZYM 10000V sudėtyje esantis dažiklis azorubinas (E122) gali sukelti alerginių reakcijų. **Dozavimas:** MEZYM visada vartokite tiksliai taip, kaip nurodė gydytojas. MEZYM dozės priklauso nuo virškinimo sutrikimų laipsnio, optimali dozė nustatoma individualiai. Jeigu kitaip nenurodyta, valgant išgeriamos 2–4 plėvele dengtos MEZYM 10000V tabletės arba 1–2 plėvele dengtos MEZYM 20000V tabletės. Dienos dozė 15000–20000 lipazės vienetų kilogramui kūno svorio neturėtų būti viršijama. Dozes vaikams turi paskirti gydytojas. Priklausomai nuo maisto ar virškinimo sutrikimo sunkumo, rekomenduojama dozė gali būti padidinta. Plėvele dengtos tabletės nurijamos nekramtant ir užsigeriant dideliu skysčio kiekiu. Ilgalaikio gydymo atveju vartojimo trukmę nustato gydytojas. Vartojimo trukmę vaikams taip pat nustato gydytojas.
Reklama paruošta: 2018 m. sausio mėn. LT_Mez_02_2018_v1

MEZYM – PADEDA PAGERINTI SUTRIKUSĮ VIRŠKINIMĄ*!
*** kai kasa išskiria nepakankamai virškinimo fermentų**

2,99 €

OMEP UNO 20 mg, 14 skrandyje neirių kietųjų kapsulių

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Veikliosios medžiagos, stiprumas: vienoje skrandyje neirioje kietojoje kapsulėje yra 20 mg omeprazolo. **Indikacijos:** „Omep Uno" vartojamas suaugusiems žmonėms trumpalaikiam refliukso simptomų gydymui. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** rekomenduojama vartoti vieną kapsulę per parą. Kapsules reikia nuryti nepažeistas ryte, užsigeriant puse stiklinės vandens. **Kontraindikacijos:** „Omep Uno" negalima vartoti kartu su nelfinaviru, jeigu yra padidėjes jautrumas omeprazolui (o taip pat pantoprazolui, lansoprazolui, rabeprazolui, ezomeprazolui) ar bet kuriai pagalbinei vaisto medžiagai. Sudėtyje yra sacharozės. Sandoz Pharmaceuticals d. d. filialas, Šeimyniškių g. 3A, LT-09312 Vilnius, Lietuva. BS2011124231. Reklamos teksto parengimo data: 2020 11 12.

STIPRI PAGALBA NUO RĖMENS!

16,99 €

SKUBI KONTRACEPCIJA

ELLAONE 30 mg, 1 tabletė

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Kiekvienoje tabletėje yra 30 mg ulipristalio acetato. **Terapinės indikacijos.** Skubioji kontracepcija praėjus ne daugiau kaip 120 valandų (5 paroms) nuo lytinio akto, kurio metu nebuvo naudotasi kontraceptinėmis priemonėmis, ar nesėkmingo priemonės panaudojimo. **Vartojimo būdas ir dozavimas.** Kuo greičiau, tačiau praėjus ne daugiau kaip 120 valandų (5 dienoms) nuo lytinio akto, kurio metu nebuvo naudotasi kontraceptinėmis priemonėmis, ar nesėkmingo apsisaugojimo priemonės panaudojimo, reikia išgerti vieną tabletę. „ellaOne" galima vartoti bet kuriuo mėnesinių ciklo metu. Jeigu praėjus trims valandoms, išgėrus „ellaOne", pradedama vemti, reikia išgerti kitą tabletę. Jei moters mėnesinės veluoja arba esant nėštumo požymių, prieš skiriant „ellaOne", reikia įsitikinti, kad pacientė ne nėščia. **Kontraindikacijos.** Padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės.** „ellaOne" skirtas vartoti tik tam tikrais atvejais. Šiuo preparatu jokiais būdais negalima pakeisti nuolatinės kontracepcijos. Bet kuriuo atveju moterims reikia rekomenduoti pradėti naudoti nuolatinės kontracepcijos priemones. „ellaOne" negalima vartoti nėštumo metu ar įtariant nėštumą. Tačiau „ellaOne" nenutraukia esamo nėštumo. Nerekomenduojama vartoti ulipristalio acetato kartu su skubiosios kontracepcijos priemonėmis, kurių sudėtyje yra levonorgestrelio.

SEKSAS NEPASIKEITĖ, BET SKUBI KONTRACEPCIJA – TAIP!

SUPER PASIŪLYMAI

1,99 €

NUO SKAUSMO IR KARŠČIAVIMO

IBUPROM EXPRESS, 400 mg, 10 minkštųjų kapsulių

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Veikliosios medžiagos, stiprumas: ibuprofenas, 400 mg. Indikacijos: silpno ar vidutinio stiprumo skausmo, tokio kaip menesinių, galvos, dantų, raumenų, sąnarių, malšinimas, karščiavimo mažinimas. Vartojimo būdas ir dozavimas: suaugusiesiems ir vyresniems negu 12 m. vaikams trumpalaikiam pagalbiniam gydymui kas 4 valandas geriama 1 kapsulė (negerti daugiau kaip 3 kapsulių per parą). Kapsulių negalima kramtyti. Kapsulę reikia užsigerti stikline vandens. Kontraindikacijos: vaisto vartoti negalima, jeigu yra alergija ibuprofenui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai, praeityje yra buvę padidėjusio jautrumo reakciju vartojant kitą nesteroidinį vaistą nuo uždegimo, yra sunkus kepenų, inkstų ar širdies funkcijos nepakankamumas, yra ar praeityje buvo pepsinė opa, yra buvęs kraujavimas iš virškinamojo trakto ar jo prakiurimas, yra kraujavimas į smegenis, į virškinamąjį traktą arba kitokis kraujavimas, yra sisteminė raudonoji vilkligė; paskutinis nėštumo trimestras. Specialūs įspėjimai: specialių atsargumo priemonių reikia, jeigu sutrikusi inkstų, kepenų, širdies ir virškinamojo trakto veikla, vartojama kitų nesteroidinių vaistų nuo uždegimo, sergama bronchine astma, alerginėmis ligomis ar sistemine raudonąja vilklige; senyviems žmonėms. Teksto parengimo data: 2020-05-04.

YRA „IBUPROM". NĖRA SKAUSMO.

IKI -35 %

IR GINTARINE.LT

KRAUJOSPŪDŽIO MATUOKLIAI, INHALIATORIAI IR TERMOMETRAI

OMRON

Hipertenzija ir priešdžių virpėjimas (AFib) yra du pagrindiniai insulto rizikos veiksniai. Matuokite kraujospūdį kasdien. Jau 80 metų Omron yra naujausių technologijų lyderis. Su Žingsniamačiu WSIII: atsikratykite nereikalingo svorio, skatinkite medžiagų apykaitą, sutvirtinkite raumenis. Džiaukitės ir išlikite jauni! Naujiena Lietuvoje „Omron" bekontaktis termometras GT720. Saugus, patogus ir greitas matavimas. Ypač patogu tėvams, auginantiems mažus vaikus. Gydyti inhaliacijomis – puikus pasirinkimas visai šeimai! Dažnas kosulys, švokštimas, dusulys, skausmas krūtinėje, laringitas, astma ar tiesiog peršalimas... „Omron" inhaliatoriai padės sušvelninti šiuos simptomus. Jie veikia tylėsi, labai smulkios dalelės, greitas vaistų išpurškimas.

NUO 2,99 €

NUO PILVO PŪTIMO

ANTIFLAT®

42 mg, 50 kramtomųjų tablečių 2,99 €

41,2 mg/ml, 50 ml geriamoji suspensija 4,99 €

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Vienoje kramtomojoje tabletėje yra 42 mg simetikono
1 ml geriamosios suspensijos yra 41,2 mg simetikono
Simetikonas
Indikacijos. Pernelyg gausaus dujų susidarymo ir sankaupos žarnyne sukeltų simptomų mažinimas. Paciento parengimas prieš organų diagnostiniam tyrimui ultragarsu ar rentgenu, siekiant pašalinti susikaupusias dujas ir pagerinti vaizdą. Putojimo mažinimas apsinuodijus paviršiaus įtempimą didinančiomis medžiagomis (tik suspensijai). **Dozavimas ir vartojimo būdas. Kramtomosios tabletės.** Vyresni kaip 6 metų vaikai ir paaugliai. Gerti po 1 tabletę tris kartus per parą valgymo metu arba pavalgius. Pirmėkus papildomai 1 tabletę galima išgerti prieš miegą. Suaugusieji. Gerti po 1–2 tabletes tris kartus per parą valgymo metu arba pavalgius. Pirmėkus papildomai 1–2 tabletes galima išgerti prieš miegą. Suaugusiųjų parengimas pilvo organų diagnostiniam tyrimui. Gerti po 2–3 tabletes po kiekvieno valgymo vieną dieną prieš numatomą tyrimą ir 6 ryto tyrimo dieną. Pirmėkus Antiflat® kramtomąsias tabletes galima vartoti ilgesnį laiką. Tabletes reikia sukramtyti. **Suspensija.** Vartojimas esant pernelyg gausiam dujų susidarymui. Suaugusieji ir paaugliai (≥ 12 metų) – 1–2 ml valgymo metu arba po valgio, užsigeriant gurkšneliu vandens; papildomai prireikus – 1 ml prieš miegą. Vaikai (nuo ≥ 2 metų iki < 12 metų) – 1 ml valgymo metu arba po valgio, užsigeriant gurkšneliu vandens; papildomai prireikus – 1 ml prieš miegą. Kūdikiai ir maži vaikai (nuo 0 iki 2 metų) – 1 ml kiekvienam kūdikio ar mažo vaiko maisto buteliukui. Vartojimas suaugusiųjų parengimui pilvo organų diagnostiniam tyrimui. 2–3 ml rekomenduojami po valgio vieną dieną prieš numatomą tyrimą ir iš ryto tyrimo dieną. Vartojimas apsinuodijus detergentais (priešnuodis). Dozė priklauso nuo apsinuodijimo sunkumo. Minimali rekomenduojama Antiflat® geriamosios suspensijos dozė yra 5 ml. Antiflat® geriamąją suspensiją galima gerti valgymo metu arba pavalgius; ją galima įšešinti į šaltus arba šiltus gėrimus (pvz., arbatą, vandenį, pieną) arba į vaiko skystą maistą (buteliuką). Prieš vartojimą reikia supurtyti. **Kontraindikacijos.** Padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės.** Vienoje Antiflat® kramtomojoje tabletėje yra sacharozės ir gliukozės. **Nėštumo ir žindymo laikotarpis.** Atsižvelgiant į tai, kad simetikonas neabsorbuojamas, Antiflat® kramtomąsias tabletes ir geriamąją suspensiją galima vartoti nėštumo ir žindymo laikotarpiu, tačiau vartojimo trukmė negali būti ilgesnė kaip 3 dienos, po to reikia daryti 14 dienų pertrauką. Nepageidaujamas poveikis nepastebėtas.

PILVO NEBEPŪS KAIPMAT, JEI VARTOSI ANTIFLAT®!

-40 %

IR GINTARINE.LT

ODAI

INOBIO HERBA BALM

Šildantis kūno balzamas su eteriniais aliejais, 40 ml

pušis - eukaliptas - čiobrelis - arbatmedis - kamparo

Kūno balzamas tepamas ant krūtinės, nugaros bei padų turi efektyvų poveikį odai. Jis švelniai maitina odą dėl jame esančio sviestmedžio aliejaus ir Vit E. Puikiai tinka vaikų odos priežiūrai.

INOBIO ACTIVE GEL

dvigubo poveikio šaldomasis-šildomasis kūno gelis, 100 ml

mėta – eukaliptas – arnica – medetka – apelsinas – pipirmėtė – kedras – čiobrelis – levanda – mentolis

Masažinio kūno gelio sudėtyje esantis mentolis ir pipirmėčių eterinis aliejus šaldo, taip nuramindami jūsų odą. Šaldantis pojūtis pereina į malonų šildantį dėl sudėtyje esančio kamparo, eukaliptų, kedrų, čiobrelių, levandų, apelsinų eterinių aliejų ir žolelių ekstraktų derinio. Gelis pratur tintas glicerinu, kuris puikiai drėkina odą.

INOBIO HEMA GEL

odos gelis su arnika ir trokserutinu, 50 ml

arnica – kaštonas – mėta – trokserutinas

Odos gelis su arnika ir trokserutinu drėkina ir ramina odą. Sudėtinių medžiagų derinys stiprina natūralų apsauginį odos barjerą, skatina epidermio regeneraciją ir gali padėti užmaskuoti matomus kapiliarų pažeidimus. Mėtų eterinis aliejus maloniai vėsina sudirgintą odą, taip susilpnindamas odos tempimo, deginimo pojūtį.

2,99 €

ODOS PAŽEIDIMAMS GYDYTI

RECREOL® 50 mg/g, kremas, 50 g; tepalas, 50 g

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 g tepalo yra 50 mg dekspantenolio. **Indikacijos:** paviršinių odos pažeidimų (tokių kaip maži nudegimai ir žaizdos, odos nubrozdinimai ir įtrūkimai), odos uždegimo (atsirandančio dėl spindulinio gydymo, fototerapijos ar ultravioletinių spindulių) pagalbinis gydymas. **Dozavimas ir vartojimo būdas:** vartoti išoriškai. Įprastinis dozavimas yra vieną ar kelis kartus per parą plonu sluoksniu tepti pažeistą odą. Gydymo trukmė priklauso nuo ligos kilmės ir eigos.
Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai.
Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės: reikia vengti atsitiktinio dekspantenolio kontakto su akimis.

Teksto peržiūros data: 2017-04-24
Vietinis rinkodaros teisės turėtojo atstovas. AB GRINDEKS filialas, Kalvarijų g. 300, LT-08318 Vilnius.
Reklamos teksto parengimo data. 2019-03-25.

EFEKTYVUS GYDYMAS IR RŪPESTINGA ODOS PRIEŽIŪRA!

5,99 €

NUGAROS, SPRANDO SKAUSMAMS IR RADIKULITUI GYDYTI

CAPSICAM® vaistinis šildomasis tepalas, 50 g

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Tepalas Capsicam®. Nereceptinis vaistas. 1 g tepalo yra 50 mg dimetilsulfoksido, 30 mg raceminio kamparo, 30 mg terpentino eterinio aliejaus, 20 mg benzilnikotinato, 2 mg nonivamido. **Terapinės indikacijos:** vietinis raumenų ir sąnarių skausmo malšinimas. **Dozavimas ir naudojimo būdas:** norint sukelti skausmą malšinantį poveikį, ant skaudamos vietos aplikatoriumi užtepama 1–3 g (6–18 cm) tepalo 2–3 kartus per parą, atsižvelgiant į skausmo intensyvumą. Norint ilgiau išlaikyti šildomąjį tepalo poveikį, ant skaudamos vietos reikia uždėti tvarstį. Didžiausia vienkartinė dozė – 3 g. Didžiausia paros dozė – 9 g. Po kiekvienos procedūros reikia nusiplauti rankas šaltu vandeniu su muilu. Naudoti ant odos. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas veikliosioms medžiagoms arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Odos opos, žaizdos bei ligos, kai yra pažeistas odos paviršius. **Vietinis rinkodaros teisės turėtojo atstovas:** AB „Grindeks" filialas, Kalvarijų g. 300, LT-08318 Vilnius. Reklamos teksto parengimo data 2016-12-05.

ŠILUMA GYDO!

Nuolaidos galioja su vaistinės lojalumo kortelėmis.

NUO 2^{99} €

NUO SLOGOS

XYMELIN

XYMELIN, 1 mg/ml, nosies lašai (tirpalas), 10 ml 2^{99} €
XYMELIN MENTHOL, 1 mg/ml, nosies purškalas (tirpalas), 10 ml 3^{99} €
XYMELIN, 1 mg/ml, nosies purškalas (tirpalas), 10 ml 3^{99} €

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 ml tirpalo yra 1 mg ksilometazolino hidrochlorido. Indikacijos: rinito ar sinusito sukelto nosies gleivinės paburkimo mažinimas. Vartojimo būdas ir dozavimas: vyresniems kaip 10m. vaikams ir suaugusiesiems: 1 įpurškimas arba 1–2 lašai į kiekvieną nosies landą 2–3 kartus per parą. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei vaisto medžiagai, uždaro kampo glaukoma, sausasis nosies gleivinės uždegimas, jei hipofizės ar smegenų operacija atlikta pro nosį arba burną. Specialūs įspėjimai: sergant cukriniu diabetu ar esant hipertiroidizmui vartoti atsargiai. Sergant sunkiomis širdies ir kraujagyslių ligomis ar ligomis, kurių metu susiaurėja kraujagyslės, vartoti tik su gydytojo leidimu. Ilgiau kaip 7 paras šio vaisto vartoti draudžiama. Dažnai ir ilgai vartojant vaistą gali atsinaujinti nosies gleivinės paburkimas, susilpnėti jo slopinimas ir atsirasti nosies užgulimas. Reklamos teksto parengimo data 2020-06-16. C-APROM/LT/XYLO/0002

PAJUSK PASAULIO KVAPUS SU XYMELIN®!

NUO 4^{99} €

NUO RAUMENŲ IR SĄNARIŲ SKAUSMO

VIPROSAL B®

VIPROSAL B®, tepalas, 50 g 4^{99} €
VIPROSAL B®, tepalas, 75 g 6^{99} €

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 g tepalo yra 0,05 V gyvačių nuodų, 10 mg salicilo rūgšties, 30 mg raceminio kamparo ir 30 mg terpentino eterinio aliejaus. **Indikacijos:** sąnarių ir raumenų skausmui malšinti. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** nedidelis „Viprosal B®" kiekis (5–10 g, t. y. 1 ar 2 arbatiniai šaukšteliai, atsižvelgiant į pažeistos vietos plotą) užtepamas ant skaudamos vietos ir įtrinamas į odą 1 arba 2 kartus per parą. Tepti ant odos. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas veikliosioms medžiagoms arba bet kuriai pagalbinei medžiagai, odos opa ar kitos odos ligos. **Specialūs įspėjimai:** „Viprosal B®" negalima tepti ant pažeistos odos. Saugotis, kad tepalo nepatektų ant gleivinės ar į akis. Vietinis rinkodaros teisės turėtojo atstovas: AB „Grindeks" filialas, Kalvarijų g. 300, LT-08318 Vilnius. Reklamos teksto parengimo data 2015-09-29.

GYVAČIŲ NUODŲ GYDOMOJI GALIA!

NUO 2^{99} €

NUO RĖMENS

MAALOX

MAALOX 400 mg/400 mg kramtomosios tabletės (be cukraus), 40 tablečių 2^{99} €
MAALOX 40 mg/35 mg/ml geriamoji suspensija, 250 ml 3^{99} €
MAALOX 460 mg/400 mg/4,3 ml geriamoji suspensija, 20 paketėlių 4^{99} €

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Veikliosios medžiagos, stiprumas: viename vienadoziame 4,3 ml geriamosios suspensijos paketėlyje yra 460 mg aliuminio hidroksido ir 400 mg magnio hidroksido; vienoje kramtomojoje tabletėje yra 400 mg magnio hidroksido ir 400 mg aliuminio hidroksido; viename ml geriamosios suspensijos yra 40 mg magnio hidroksido ir 35 mg aliuminio hidroksido. **Indikacijos:** rėmens ir skrandžio turinio kilimo į stemplę simptomams malšinti suaugusiems ir paaugliams nuo 15 metų. **Vartojimo būdas ir dozavimas. Suspensija:** geriama po 1 arba 2 vienadozių paketėlių turinį, pasireiškus rėmeniui arba refliuksui; negalima gerti daugiau kaip 8 paketėlių per parą; prieš atplėšiant paketėlį, jį reikėtų švelniai paspaudyti; suspensiją reikėtų gerti neskiestą. Buteliuko suspensija geriama po vieną valgomąjį šaukštą (15 ml) pasireiškus rėmeniui arba skrandžio turinio refliuksui į stemplę; negalima gerti daugiau kaip 6 valgomųjų šaukštų (90 ml) per parą; šio vaisto negalima vartoti ilgiau kaip 10 dienų. **Tabletės:** sučiulpti arba sukramtyti 1–2 tabletes, pajutus rėmenį arba atsiradus refliuksui; negalima vartoti daugiau kaip 6 kartus per parą ir daugiau kaip 8 tablečių per parą. **Kontraindikacijos:** alergija (padidėjęs jautrumas) magnio hidroksidui ar aliuminio hidroksidui arba bet kuriai pagalbinei medžiagai; sunki inkstų liga; stiprus pilvo skausmas arba įtariamas žarnų nepraeinamumas. **Specialūs įspėjimai:** vaistą galima vartoti tik pasitarus su gydytoju, jeigu mažėja kūno svoris, kraujuoja arba anksčiau yra kraujavę iš virškinimo trakto, sutrikęs rijimas arba nuolat jaučiate nemalonų pojūtį pilve, virškinimo sutrikimų atsirado pirmą kartą arba jie neseniai pakito, sergate inkstų liga. Pacientams, kuriems nustatytas inkstų funkcijos sutrikimas, jaunesniems kaip 2 metų vaikams, senyviems pacientams bei kitiems pacientams, kuriems yra fosforo trūkumo pavojus, prieš pradedant vartoti Maalox reikia kreiptis į gydytoją. Norint išvengti perdozavimo, negalima kartu vartoti vaistinių preparatų, savo sudėtyje turinčių aliuminio hidroksido ir magnio hidroksido. Jeigu gydytojas Jums yra sakęs, kad netoleruojate kokių nors angliavandenių, kreipkitės į jį prieš pradėdami vartoti šį vaistą. Maalox (be cukraus) tabletės tinka cukriniu diabetu sergantiems pacientams. Teksto parengimo data: 2020 m. sausio mėn. Reklamos teksto parengimo data: 04/2020. SALT.MAA.20.04.0064

GREITA PAGALBA NUO RĖMENS!

5^{99} €

GREITAM IR EFEKTYVIAM SKAUSMO BEI KARŠČIAVIMO MALŠINIMUI

UPSARIN C 330 mg/200 mg, 20 šnypščiųjų tablečių

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Sudėtis: 330 mg acetilsalicilo rūgšties, 200 mg askorbo rūgšties. Terapinė indikacija: silpno arba vidu-tinio stiprumo skausmo malšinimas ir (arba) karščiavimo mažinimas. Dozavimas ir var-tojimo būdas: suaugusiesiems ir paaugliams nuo 16 m. po 1–2 tabletes, ne dažniau kaip kas 4 val., ne daugiau kaip 9 tabletės per parą. Senyviems pacientams – ne daugiau kaip 6 tabletės per parą. Vartoti per burną. Prieš vartojimą ištirpinti tabletę stiklinėje vandens. Kontraindikacijos ir specialūs įspėjimai: negalima vartoti moterims paskutinius 4 nėš-tumo mėnesius ir žindymo laikotarpiu, vaikams ir paaugliams iki 16 m., asmenims, kurių padidėjęs jautrumas bent vienai sudedamajai medžiagai, sergant ūmine skrandžio ar dvylikapirštės žarnos opa, esant inkstų, kepenų, širdies nepakankamumui ir kt. Net vartojant mažiausiomis dozėmis, acetilsalicilo rūgštis didina kraujavimo pavojų, todėl negalima vartoti sergant hemofilija, hemochromatoze, su antikoaguliantais, jei sirgote opa, esant G6FD trūkumui. Atsargiai vartoti esant gausioms menstruacijoms, astmai, podagrai, šlapimtakių akmenligei, ilgai vartojant kitus vaistus nuo skausmo, senyvo amžiaus žmonėms. Teksto parengimo data: 2020.03.20. PM_LT_2020_3_306. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti Jūsų sveikatai. Jei simptomai nepraeina ar atsirado šalutinis poveikis, dėl tolesnio vaisto vartojimo būtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku. Jeigu įtariate, kad Jums pasireiškė šalutinis poveikis, apie jį praneškite savo gydytojui, vaistininkui ar Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos el. paštu NepageidaujamaR@vvkt.lt arba kitais būdais, kaip nurodyta jos interneto svetainėje www.vvkt.lt.

-25 %

IR GINTARINE.LT

OLIDETRIM

OLIDETRIM 2000 TV, 60 minkštųjų kapsulių
OLIDETRIM OMEGA 2000 D$_3$+K$_2$, 30 minkštųjų kapsulių

MAISTO PAPILDAI

Vitaminas D padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą.
„OLIDETRIM® OMEGA 2000 D3 + K2" maisto papildas, kuriame subalansuota vitamino D3, K2 ir omega-3 rūgščių koncentracija.
Siekiant maksimaliai padidinti vitamino D papildo naudą, juos naudinga vartoti kartu su vitaminu K2. Sudėtyje esančios omega-3 rūgštys padeda palaikyti normalią širdies ir smegenų veiklą.
Rekomenduojama vartoti 1 kapsulę per parą.

GERIAUSIA GYNYBA – STIPRUS IMUNITETAS

NUO GRIPO
IR PERŠALIMO

4^{99} €

WIPAR 500 mg/60 mg + 500 g/25 mg, 16 plėvele dengtų tablečių

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Sudėtis. Vienoje dienos tabletėje yra 500 mg paracetamolio ir 60 mg pseudoefedrino hidrochlorido. Vienoje nakties tabletėje yra 500 mg paracetamolio ir 25 mg difenhidramino hidrochlorido. **Terapinės indikacijos. „Wipar" skirtas trumpalaikiam simptominiam nosies ir prienosinių ančių gleivinės užburkimo su peršalimo ir gripo požymiais, tokiais kaip skausmas, galvos skausmas ir (ar) karščiavimas, įskaitant skausmo simptomus, pasireiškiančius prieš miegą, kurie sukelia sunkumus užmigti, gydymui. „Wipar" skirtas suaugusiesiems bei 15 metų ir vyresniems paaugliams. Dozavimas. Dienos metu: vartoti po vieną geltoną tabletę, kuri nesukelia mieguistumo, kas 4–6 val. per dieną (ne daugiau kaip 3 geltonas tabletes per dieną). Nakties metu: vartoti vieną mėlyną tabletę einant miegoti. Ši tabletė sukelia mieguistumą. Gydymą tęsti ne ilgiau kaip 4 paras. Netinka vartoti senyviems žmonėms, kuriems pasireiškia sumišimo požymių. Silpniems, nejudriems, senyviems asmenims gali tikti retesnis dozės vartojimas. Pacientai, kuriems nustatyta sutrikusi kepenų ar inkstų funkcija, prieš vartodami šį vaistinį preparatą turi pasitarti su gydytoju.** Kontraindikacijos. „Wipar" tablečių negalima vartoti: jeigu yra alergija paracetamoliui, pseudoefedrinui, difenhidraminui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai, jeigu yra labai aukštas kraujospūdis, sergate sunkia širdies liga ir vartojate vaistus beta adrenoblokatorius, jeigu vartojate kitų simpatomimetikų – paburkimą mažinančių vaistų (tokių kaip nosies užgulimą mažinantys) ar monoaminooksidazės inhibitorių (vaistų nuo Parkinsono ligos arba depresijos), arba vartojote juos per pastarąsias 14 d., jeigu sergate cukriniu diabetu, feochromocitoma, glaukoma, sunkia inkstų liga, turite šlapinimosi sutrikimų (šlapimo užsilaikymas) ar yra padidėjęs skydliaukės aktyvumas. Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės. Difenhidraminas gali sukelti mieguistumą. Dienos metu NEVARTOKITE mėlynos tabletės. Siekiant išvengti perdozavimo, nevartokite kartu su jokiais kitais paracetamolio, nosies užgulimą mažinančių ar antihistamininių medžiagų turinčiais preparatais, įskaitant vietiškai veikiančius antihistamininius vaistus ir kitus vaistus nuo gripo ir kosulio. Prieš vartodami „Wipar" pasitarkite su gydytoju arba vaistininku, jeigu vartojate antidepresantus, raminamuosius, opioidinius skausmą malšinančius vaistus, vaistus nuo psichozių ir trankviliantus ar vaistus, kurie gali paveikti kepenų funkciją, jeigu sergate inkstų arba kepenų liga (pvz., Žilberto (Gilbert) sindromu), jei jums nustatyta fermento gliukozo-6-fosfatdehidrogenazės ar glutationo trūkumas, yra mažakraujystė, kamuoja skysčių stoka, yra lėtinis mitybos sutrikimas, kūno svoris mažesnis negu 50 kg, esate senyvo amžiaus, sergate cukriniu diabetu, yra astma, lėtinis kosulys, ar emfizema, yra prostatos sutrikimų, sergate alkoholizmu, kamuoja psichozė, yra sutrikusi kraujotaka arterijose arba venose (okliuzinė kraujagyslių liga). Jeigu jums pasireiškia karščiavimas ir išplitusi raudonė su pustulėmis (smulkiais pūlinėliais), nutraukite „Wipar" vartojimą ir nedelsdami kreipkitės į savo gydytoją ar kitus medikus. Reklamos teksto parengimo data 2020-10-15.

SUPER PASIŪLYMAI

3,99 €

FERVEX

FERVEX granulės geriamajam tirpalui, vaikams, 8 paketėliai
FERVEX granulės geriamajam tirpalui, suaugusiems, be cukraus, 8 paketėliai
FERVEX granulės geriamajam tirpalui, suaugusiems, 8 paketėliai

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Veikliosios medžiagos ir stiprumas. *Fervex suaugusiems ir suaugusiems be cukraus:* 500 mg paracetamolio, 25 mg feniramino maleato, 200 mg askorbo rūgšties; *Fervex vaikams:* 280 mg paracetamolio, 10 mg feniramino maleato, 100 mg askorbo rūgšties. **Terapinės indikacijos.** Trumpalaikis ūminių peršalimo ligų simptomų (karščiavimo, nosies gleivinės paburkimo, skausmo) lengvinimas. *Fervex vaikams:* trumpalaikis ūminių peršalimo ligų simptomų (karščiavimo, nosies gleivinės paburkimo, skausmo) lengvinimas vaikams nuo 6 iki 15 metų. **Dozavimas ir vartojimo būdas.** *Fervex-suaugusiems ir suaugusiems be cukraus:* gerti po vieną paketėlį 2–3 kartus per parą. *Fervex vaikams: vaikams nuo 6 iki 10 metų* gerti po 1 paketėlį 2 k./parą; *nuo 10 iki 12 metų* gerti po 1 paketėlį 3 kartus per parą; *nuo 12 iki 15 metų* gerti po 1 paketėlį 4 k./parą, bet ne dažniau kaip kas 4 val. **Kontraindikacijos.** Padidėjęs jautrumas vaisto sudedamosioms dalims, sunkus kepenų nepakankamumas, aktyvios kepenų ligos, uždaro kampo glaukoma, šlapimo susilaikymas, skrandžio prievarčio stenozė, šlapimo takų akmenys, vaikams ir paaugliams iki 15 m.; *Fervex vaikams:* vaikams iki 6 metų. **Specialūs įspėjimai.** Pasitarkite su gydytoju arba vaistininku jeigu Jūs sergate Žilbero sindromu, sunkia inkstų liga; hemolizine anemija, epilepsija, linkę susidaryti akmenys šlapimo takuose, jautrumas acetilsalicilo rūgščiai, piktnaudžiaujate alkoholiu, yra anorekcija, dehidratacija, esate suaugęs sveriantis mažiau nei 50 kg, esant G6FD trūkumui ir sutrikusiai geležies apykaitai. Nevartokite kartu jokio kito vaisto, kurio sudėtyje yra paracetamolio. Cukriniu diabetu sergantiems atsargiai vartoti Fervex suaugusiems ir sergantiems fenilketonurija atsargiai vartoti *Fervex suaugusiems be cukraus*. **Teksto parengimo data:** 2020.03.20 PM_LT_2020_3_307

4,99 €

ODOS IR LŪPŲ PŪSLELINEI GYDYTI

ACIC 5 % kremas, 2 g

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Veikliosios medžiagos, stiprumas: viename grame „Acic" 5 % kremo yra 50 mg acikloviro. **Indikacijos:** vaistas skirtas odos ir lūpų pūslelinei, kurią sukelia Herpes simplex virusas, gydyti. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** pažeistą odos vietą tepti plonu sluoksniu 5 kartus per parą kas 4 val. **Kontraindikacijos:** „Acic" naudoti negalima esant padidėjusiam jautrumui aciklovirui, valaciklovirui, propilenglikoliui arba bet kuriems pagalbiniams „Acic" medžiagoms. Kremo negalima tepti ant gleivinės (burnos, akių, makšties). **Specialūs įspėjimai:** vaisto draudžiama nuryti. Specialių atsargumo priemonių reikia susilpnėjus imunitetui. „Sandoz Pharmaceuticals d.d." filialas, Šeimyniškių g. 3A LT-09312 Vilnius, Lietuva. BS2011050402. Reklamos teksto parengimo data: 2020 11 05.

UŽBLOKUOK LŪPŲ PŪSLELINĘ SU „ACIC"!

GAMINAME VAISTUS PAGAL INDIVIDUALIUS RECEPTUS

- Atneškite gydytojo receptą iki 13 val. į bet kurią „Gintarinę vaistinę".
- Atsiimkite pagamintą vaistą kitą darbo dieną.

Gintarinė vaistinė

Mums gera jumis rūpintis

Nuolaidos galioja su vaistinės lojalumo kortelėmis.

-40 %

IR GINTARINE.LT

IMUNITETUI, GERKLEI, KVĖPAVIMO TAKAMS

COLDACTIVE

COLDACTIVE IMMUNO milteliai geriamajam tirpalui, 10 paketėlių

COLDACTIVE GERKLEI milteliai geriamajam tirpalui, 10 paketėlių

COLDACTIVE SINUS milteliai geriamajam tirpalui, 10 paketėlių

MAISTO PAPILDAI

Pasirūpinti sveikata padės karštieji gėrimai su vaistažolių ekstraktų deriniais: COLDACTIVE GERKLEI skirtas gerklei ir imunitetui, COLDACTIVE IMMUNO – imunitetui ir organizmo apsaugai, COLDACTIVE SINUS – kvėpavimo takams ir imunitetui. Juoduogių šeivamedžių ir paprastųjų erškėčių ekstraktai padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą, Islandinių kerpenų ir afrikinių pelargonijų ekstraktai – gerklės ir kvėpavimo takų funkcijas, mažalapių liepų ekstraktas – apsauginę organizmo funkciją. Vartojimas: paketėlio turinį užpilti 150 ml karšto vandens. Rekomenduojama paros dozė: COLDACTIVE GERKLEI – 1-3 paketėliai, COLDACTIVE SINUS ir IMMUNO – 1-2 paketėliai.

KARŠTI VAISTAŽOLIŲ EKSTRAKTŲ GĖRIMAI IMUNITETUI. DAUGIAU NEI ARBATA.

6 99 €

PERŠALUS

ACTIFED®

ACTIFED® 60 mg/2,5 mg tabletės, 12 tablečių

ACTIFED® 30 mg/1,25 mg/5 ml sirupas, 100 ml

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

1 tabletėje yra 60 mg pseudoefedrino hidrochlorido ir 2,5 mg triprolidino hidrochlorido / 5 ml sirupo yra 30 mg pseudoefedrino hidrochlorido ir 1,25 mg triprolidino hidrochlorido. **Indikacijos:** nosies ir viršutinių kvėpavimo takų gleivinės uždurkimo (užgulimo) peršalus mažinimas. Nosies tekėjimo ir čiaudulio slopinimas. **Dozavimas ir vartojimo metodas:** suaugusiesiems ir vyresniems kaip 12 m. vaikams: po 1 tabletę arba po 10 ml sirupo kas 4–6 val. iki 4 kartų per parą. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Pacientai, kurie vartoja ar per pastaruosius 14 dienų vartojo monoaminooksidazės inhibitorių. Širdies ir kraujagyslių ligos, hipertenzija, sunkus inkstų funkcijos sutrikimas, diabetas, feochromocitoma, hipertirozė, uždaro kampo glaukoma. Draudžiama kartu vartoti kitus simpatomimetinius dekongestantus ir beta blokatorius. Vaikai iki 12 metų. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės:** „ACTIFED®" gali sukelti mieguistumą. Nevartoti kartu alkoholio. „ACTIFED®" vartojimą reikia nutraukti, jei pasireiškia šie sutrikimai: haliucinacijos, neramumas, miego sutrikimai, karščiavimas ir išplitusi raudonė su smulkiais pūlinėliais, staiga netekus regos arba sumažėjus regos aštrumui, staigus pilvo skausmas, kraujavimas iš išangės ar kiti išeminio kolito simptomai. Pacientai, sergantys kepenų liga, vidutinio sunkumo inkstų funkcijos sutrikimu, ACTIFED® turėtų vartoti atsargiai. Vaistas negali būti vartojamas vaikams raminti. Actifed tabletių sudėtyje yra laktozės - jeigu gydytojas Jums yra sakęs, kad netoleruojate kokių nors angliavandenių, kreipkitės į jį prieš pradėdami vartoti šį vaistą. Actifed sirupo sudėtyje yra saulėlydžio geltonojo (gali sukelti alerginių reakcijų), metilo parahidroksibenzoato (gali sukelti alerginių reakcijų, kurios gali būti uždelstos), sacharozės (jeigu gydytojas Jums yra sakęs, kad netoleruojate kokių nors angliavandenių, kreipkitės į jį prieš pradėdami vartoti šį vaistą. Būtina atsižvelgti cukriniu diabetu sergantiems pacientams). **Teksto peržiūros data:** 2020.12.16. MAT/5.210/03/2018.

GREITAS PALENGVĖJIMAS PERŠALUS.

-40 %

IR GINTARINE.LT

VITAMINAS C 1000 mg, 30 tablečių

MAISTO PAPILDAS

Vitaminas C padeda palaikyti:
- normalią imuninės sistemos veiklą;
- normalų kolageno, kuris reikalingas normaliai kraujagyslių funkcijai, odos funkcijai, kaulų funkcijai, kremzlių funkcijai, dantenų ir dantų funkcijai, susidarymą;
- normalią energijos apykaitą;
- normalią nervų sistemos veiklą ir psichologinę funkciją.

Vitaminas C padeda apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės pažaidos.

VITAMINAS C PROLONG 500 MG

30 tablečių

MAISTO PAPILDAS

Tabletėje esantis **vitaminas C** išsiskiria iš lėto, tokiu būdu yra užtikrinamas ilgalaikis ir tolygus jo pasisavinimas.

Vitaminas C:
- padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą;
- padeda palaikyti normalų kolageno, kuris reikalingas normaliai kraujagyslių, odos, kaulų, kremzlių, dantenų ir dantų funkcijai, susidarymą;
- padeda palaikyti normalią energijos apykaitą;
- padeda palaikyti normalią nervų sistemos veiklą ir psichologinę funkciją;
- padeda apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės pažaidos.

HIGIENAI, VIRUSŲ PREVENCIJAI IR SLOGAI

-20 %

IR GINTARINE.LT

HUMER

HUMER sterilus jūros vanduo nosiai, nuo 15 m., 150 ml.

HUMER sterilus jūros vanduo kūdikiams ir vaikams, 150 ml

HUMER nosies purškalas sinusitui, 15 ml

HUMER hipertoninis jūros vanduo nuo slogos, 50 ml

HUMER STOP VIRUS nosies purškalas ,15 ml

HUMER jūros vanduo kūdikiams vienadozėse ampulėse, 18 vnt., 5 ml

MEDICINOS PREKĖS

„Humer" – 100 % neskiestas jūros vanduo, turtingas mikroelementų, tinkamas kūdikiams, vaikams ir suaugusiesiems. Rekomenduojamas naudoti kasdienei nosies higienai, drėkina išsausėjusią gleivinę, palengvina nosies išpūtimą, padeda pašalinti virusus bei alergenus. Natūraliai atkemša labai užgulusią nosį.

„Humer vienadozės ampulės" (5 ml x 18) – sterilus jūros vandens tirpalas kūdikių nosyčių priežiūrai. Visi produktai saugūs nėščiosioms ir maitinančioms motinoms.

Humer Stop Virus, 15 ml – nosies purškalas nuo peršalimo* ir gripo* prevencijai. Veiksmingumas patvirtintas moksliniais tyrimais: efektyvumas 99,99% peršalimo* ir gripo virusų*. Tinkamas nuo 1 metų amžiaus. * efektyvumas patvirtintas in vitro pagal NF EN 14476 metodologiją Rhino, Parainfluenza 3 ir gripo (Influenzavirus) virusams.

„Humer Sinusitui" – natūralus, iš augalinių ekstraktų, trejopo poveikio nosies purškalas labai užsikimšusiai nosiai, sergant sinusitu ar peršalus. Greitai atkemša nosį, palengvina sinusų spaudimą bei su tuo susijusį skausmą, mažina uždegimą.

HUMER - DAUGIAU NEI JŪROS VANDUO. HUMER JUS IŠLAISVINA!

PIGU

0 50 €

MUKALTINAS

50 mg, 10 tablečių

MAISTO PAPILDAS

Vartojimas: suaugusiesiems gerti po 1 tabletę, vyresniems nei 3 m. vaikams – po 0,5 tabletės 2–3 kartus per dieną (vaikams galima ištirpinti 1/3 stiklinės šilto vandens). Gamintojas – „Vifitech", Rusija.

NUO

1 99 €

SLOGUOJANT

GALAZOLIN

0,05 % nosies lašai, tirpalas, 10 ml 1 99 €

0,1 % nosies lašai, tirpalas, 10 ml 2 49 €

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Veiklioji medžiaga: ksilometazolino hidrochloridas. **Indikacijos:** nosies gleivinės paburkimo mažinimas peršalus ar susirgus alergine sloga, nosiaryklės gleivinės paburkimo mažinimas, gydant vidurinės ausies uždegimą. **Dozavimas:** 2–6 metų vaikams į kiekvieną nosies landą lašinti po 1–2 lašus 0,05 % koncentracijos tirpalo kas 8 val. Vyresniems negu 7 metų pacientams į kiekvieną nosies landą lašinti po 2–3 lašus 0,1% koncentracijos tirpalo kas 8–10 val. „Galazolin" vartoti ilgiau kaip 5–7 dienas negalima. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai, sausasis rinitas, uždaro kampo glaukoma. **Specialūs įspėjimai:** preparato negalima vartoti sergantiems širdies ar vazomotorine sloga, jei jos gydymas užtrunka ilgiau negu dvi savaites. Atsargiai vartoti pacientams, kuriems negalima vartoti simpatikomimetikų. Nevartoti kartu su MAO inhibitoriais bei triciklikais antidepresantais.NB! Informacija vartotojui yra sutrumpinta. **Reklamos teksto parengimo data:** 2018-04.

IŠLAISVINS TAVO NOSĮ!

PERŠALUS

-40 %
~~5,99~~ €
3,47 €

AMBIO BRONCHO
20 tablečių
MAISTO PAPILDAS

Islandinės kerpenos, vitaminas C, čiobrelių, pušų ir tūbių ekstraktai. Čiobrelių, islandinių kerpenų ir paprastųjų pušų ekstraktai padeda palaikyti kvėpavimo takų funkciją. Maisto papildo sudėtyje esantis vitaminas C padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą.

IKI
-40 %
IR GINTARINE.LT

AMBIO SIRUPAS GERKLEI VAIKAMS 150 ml
~~6,99~~ 4,19 € -40%
MAISTO PAPILDAS

Vaistinio čiobrelio ekstraktas padeda palaikyti normalią kvėpavimo takų funkciją. Pipirmėtės ekstraktas padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą.

AMBIO SIRUPAS GERKLEI SUAUGUSIESIEMS
150 ml ~~5,99~~ 4,19 € -30%
MAISTO PAPILDAS

Paprastojo saldymedžio šaknų ekstraktas padeda palaikyti normalią imuninės sistemos ir kvėpavimo funkciją.
Rutulinio eukalipto ir vaistinės ramunėlės ekstraktai padeda palaikyti normalią kvėpavimo sistemos funkciją.
Islandinės kerpenos ekstraktas padeda palaikyti normalią imuninės sistemos funkciją.

0,65 €

PIGU

ASKORUTINAS
50 tablečių
MAISTO PAPILDAS

Tai askorbo rūgšties (vit. C) ir rutino preparatas. Askorbo rūgštis yra viena iš svarbiausių medžiagų, reikalingų normaliai žmogaus organizmo veiklai. Ji padeda palaikyti: normalią energijos apykaitą, normalią nervų sistemos veiklą, normalią imuninės sistemos veiklą intensyvaus fizinio krūvio metu ir po jo; padeda apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės pažaidos, padeda mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį, gerina geležies absorbciją. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Vartojimas: gerti po 1 tabletę 2 kartus per dieną valgant arba po valgio. Gamintojas – Marbiofarm, Rusija.

NUO
3,85 €

DR. THEISS HUSTICUM sirupas, 50 mg/g, 100 ml 3,85 €
DR. THEISS EUCALIPIN tepalas, 50 g 5,00 €
DR. THEISS ECHINACEA FORTE 0,756 ml/ml, ger. lašai, tirpal., 50 ml 5,50 €
AUGALINIAI VAISTAI

„Dr. Theiss“ Husticum, sirupas: siauralapių gysločių lapų skystasis ekstraktas, skirtas burnos ar ryklės dirginimui ir sausam kosuliui lengvinti. Gerti 4–6 kartus per parą vienodais intervalais. 3–6 metų amžiaus vaikams po 2,5 ml; 6–12 metų vaikams – po 5 ml; nuo 12 metų – po 15 ml. Kontraindikacijos. Padidėjęs jautrumas veikliajai medžiagai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Specialūs įspėjimai. Vaikams iki 3 metų amžiaus vartoti nepatariama.
„Dr. Theiss“ Eucalipin: eukaliptų, paprastųjų pušų eteriniai aliejai, raceminis kamparas. Indikacijos: kvėpavimo takų ligos, kurias sukelė peršalimas, kosuliui, bronchitui gydyti ir savijautai pagerinti. Vartoti ant odos, įkvėpti. Kontraindikacijos. Padidėjęs jautrumas veikliajai medžiagai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Jaunesni nei 2 metų vaikai.
„Dr. Theiss“ Echinacea Forte: rausvažiedžių ežiuolių šviežios žolės sultys, skirtos trumpalaikei peršalimo profilaktikai ir peršalimui gydyti. Nuo 12 metų vartoti 3–4 kartus per parą po 55 lašus (2,75 ml). Kontraindikacijos. Padidėjęs jautrumas veikliajai medžiagai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai.

„DR. THEISS“ – NUO PERŠALIMO IR KOSULIO.

-30 %
IR GINTARINE.LT

PROPOLINK
burnos purškalas, 30 ml
MAISTO PAPILDAS

Buteliukas su purkštuvu ir aplikatoriumi be propelento dujų.
Propolis padeda sušvelninti sudirgintos gerklės simptomus bei diskomfortą. **Medaus** sudėtyje yra natūralių antioksidantų, kurie padeda palaikyti bendras organizmo apsaugos funkcijas. **Vaistinių čiobrelių** ekstraktas padeda palaikyti normalią viršutinių kvėpavimo takų funkciją, padeda sušvelninti sudirgintos gerklės simptomus. **Vitaminas C** padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą, padeda apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės pažaidos.

-30 %
IR GINTARINE.LT

RHINOSOL 10 ml
Aliejiniai lašai nosies gleivinei.
Trijų aliejų mišinys. Drėkina ir saugo nosies gleivinę, lengvina kvėpavimą. Suaugusiesiems ir vaikams.

Nuolaidos galioja su vaistinės lojalumo kortelėmis.

Flavamed®

Ambroksolio hidrochloridas

Teisingas pasirinkimas šlapio kosulio gydymui

- **Vartojamas sergant ūminėmis arba lėtinėmis plaučių ir bronchų ligomis, kai susidaro klampios gleivės.**
- **Ambroksolio hidrochloridas efektyviai skystina gleives ir padeda pašalinti jas iš plaučių**
- **Vyšnių skonio**

Nereceptinis vaistas. **Flavamed 60 mg šnypščiosios tabletės.** Vienoje tabletėje yra 60 mg ambroksolio hidrochlorido. **Terapinės indikacijos.** Flavamed vartojamas sergant plaučių ir bronchų ligomis, kai susidaro klampios gleivės. Suskystina klampias gleives ir jos gali lengviau pasišalinti. **Vartojimo būdas.** Šnypščiosios tabletės ištirpinamos stiklinėje vandens ir tirpalas geriamas po valgio. Suaugusiems ir vaikams vyresniems kaip 12 metų po 30 mg ambroksolio hidrochlorido 3 kartus per parą pirmąsias 2 ar 3 dienas, vėliau – po 30 mg ambroksolio hidrochlorido 2 kartus per parą. Be gydytojo nurodymo ilgiau kaip 4 - 5 dienas Flavamed vartoti negalima. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Flavamed 60 mg šnypščiųjų tablečių negalima vartoti vaikams iki 12 metų. **Specialūs įspėjimai.** Atsargiai reikėtų vartoti pacientams sutrikus bronchų epitelio motorikai ir esant gausiai sekrecijai; sutrikus inkstų funkcijai arba sergant sunkia kepenų liga; praeityje buvus pepsinę opą; esant histamino netoleravimui. Negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas galaktozės arba fruktozės netoleravimas, laktazės trūkumas, gliukozės-galaktozės absorbcijos sutrikimas.

Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti Jūsų sveikatai. Jei simptomai nepraeina ar atsirado šalutinis poveikis, dėl tolesnio vaisto vartojimo būtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku.

Jeigu įtariate, kad Jums pasireiškė šalutinis poveikis, apie jį praneškite savo gydytojui, vaistininkui ar Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie LR SAM el. paštu NepageidaujamaR@vvkt.lt arba kitais būdais, nurodytais jos interneto svetainėje www.vvkt.lt

Reklama paruošta 2019 m. rugpjūčio mėn.
LT_Fla_03_2019_V1

BERLIN-CHEMIE MENARINI
Jasinskio g. 16a, Vilnius LT-03163

KOSULIO SEZONAS: KADA BŪTINI VAISTAI, O KUOMET PAKANKA IR ARBATOS?

Neretai atvėsusių orų palydovu tampa peršalimo ligos ir kosulys. Šiemet kosulys įgavo dar ir kitą reikšmę – tai vienas pagrindinių COVID-19 infekcijos simptomų. Todėl sveikatos specialistai sako, kad nevalia į kosulį žiūrėti pro pirštus, o kosulio gydymas turėtų būti prioritetu. Vaistininkė pataria, kokiais atvejais po ranka turėtų būti vaistai nuo kosulio, o kuomet arbata nuo kosulio.

„Dažnai į vaistinę užėję žmonės klausia, kaip gydyti kosulį, prašo duoti kokių nors vaistų nuo jo nė negalvodami, koks būtent kosulys juos vargina – drėgnas ar sausas. Jeigu savijauta negerėja, o kosulys ne tik nesitraukia, bet ir stiprėja, pakilo kūno temperatūra – vaistai nuo kosulio nebepadės, būtina kreiptis į gydytoją ir išsitirti dėl COVID-19 infekcijos, atlikti kitus būtinus tyrimus“, – sako „Gintarinės vaistinės“ vaistininkė Inga Pociulienė.

KOSULIO GYDYMAS – KĄ REIKĖTŲ ŽINOTI?

Pasak vaistininkės, pirmiausia reikėtų išsiaiškinti, koks kosulys žmogų vargina – sausas ar drėgnas, intensyvus ar retas, spazminis ar priepuolinis, prieš kiek laiko atsirado, kokioje padėtyje žmogui esant, kuriuo paros metu dažniausiai kartojasi.

„Nėra vieno vaisto, kuris tiktų visiems kosulio tipams gydyti, todėl labai svarbu išsiaiškinti, koks šiuo metu kosulys kamuoja žmogų. Pavyzdžiui, viršutinių kvėpavimo takų infekcijų metu dažniausiai pačią pirmą dieną ima varginti sausas kosulys, o apie trečiąją dieną, jeigu gydomasi, kosulys tampa drėgnu, pradedama atsikosėti. Būtent drėgnas kosulys praneša apie sveikimą, nes jo metu pasišalina kvėpavimo takų ligų sukėlėjai bei sekretas“, – aiškina I. Pociulienė.

Intensyvus, sausas ir drėgnas kosulys vienu metu reiškia bronchitą. Virusiniam laringitui būdingas prikimęs balsas, sausas lojantis kosulys. Sergant astma, kamuoja spazminis kosulys, keliantis dusulį, būdingas kvėpavimas su apsunkintu iškvėpimu.

„Ūminis kosulys gali trukti iki 3 savaičių, o užsitęsusiu kosuliu laikomas tas, kuris trunka 3–8 savaites. Lėtiniu vadinamas kosulys, varginantis daugiau nei 8 savaites. Tokia kosulio trukmė gali išduoti apie galimą astmą, lėtinę obstrukcinę plaučių ligą ar net onkologines ligas. Ilgalaikis kosulys dažnai atsiranda ir rūkantiems žmonėms“, – teigia vaistininkė.

Alergija žiedadulkėms, naminiams gyvūnams, namų dulkių erkutėms, pelėsiams taip pat gali sukelti kosulį, kuris gali pasireikšti priepuoliais, kartais net iki dusimo.

KAIP GYDYTI SAUSĄ KOSULĮ?

Pagrindinis kosinčių žmonių klausimas, anot vaistininkės, yra slopinti kosulį ar verčiau palengvinti atsikosėjimą.

„Slopinti kosulį reikia tokiu atveju, jeigu jis yra sausas, intensyvus ir varginantis. Tuomet pirmąsias dvi ligos dienas kosulį galima malšinti įvairiais būdais. Šią funkciją atliekančių vaistų būna tiek augaliniu, tiek cheminiu pagrindu, tabletių arba sirupo pavidalu. Sauso kosulio šiukštu negalima gydyti gleives skystinančiais vaistais, nes pastarieji tik erzina kvėpavimo takus ir žmogus dar daugiau sausai kosėja“, – įspėja ji.

Įprastai po 2–3 dienų kosulys drėksta, žmogus ima atsikosėti. Tuomet jau rekomenduojama vartoti vaistus, skystinančius bronchų sekretą ir skatinančius sekreto šalinimą iš kvėpavimo takų. Tokių vaistų pasirinkimas taip pat yra nemažas – galima rinktis iš tablečių, sirupų ir lašų. Uždegimui ir skausmui malšinti taip pat tinka ir vaistai nuo skausmo.

Nuolaidos galioja su vaistinės lojalumo kortelėmis.

„Vaistų nuo drėgno kosulio pasirinkimas priklauso nuo jo intensyvumo ir trukmės. Svarbiausia yra įsidėmėti, kad tokio kosulio negalima gydyti kosulį slopinančiais vaistais, nes tuomet bronchų sekretas kaupiasi kvėpavimo takuose, gali pakilti temperatūra, atsirasti dusulys ir vystytis plaučių uždegimas“, – apie esmines gydymosi klaidas kalba I. Pociulienė.

„Gintarinės vaistinės“ vaistininkės teigimu, ne visada reikia griebtis vaistų. Jei kosulys nėra užsitęsęs, o žmogus nekarščiuoja arba temperatūra pakilusi nežymiai, galima sėkmingai gydytis ir namuose. Kartais pakanka ir paprasčiausio poilsio. Jeigu leidžia aplinkybės, medikamentų patartina vengti nėščiosioms ir vaikams. Jiems rekomenduojama gydymą pradėti nuo švelnesnių, natūralesnių priemonių, o kitų išeičių ieškoti joms nepadėjus.

„Kosulio gydymui patarčiau pasitelkti inhaliaciją su druskos tirpalu, į kurį galima įlašinti kelis lašus eukalipto eterinio aliejaus. Išimtis – jei kvėpuos mažas vaikas arba naudojamas elektrinis inhaliatorius. Naudinga nakčiai įtrinti krūtinę ir nugarą tepalu, kurio sudėtyje būtų mentolio, pušų eterinio aliejaus arba ant krūtinės užsidėti orkaitėje arba mikrobangų krosnelėje sušildytą vyšnių kauliukų pagalvėlę. Jei pagalvėlės žmogus neturi, galima į drobinį maišelį įpilti nemaltų linų sėmenų ir taip pat pašildyti. Įkaitusios sėklos maloniai sušildo krūtinę ir ramina kosulį“, – natūralias priemones rekomenduoja ji.

KURI ARBATA NUO KOSULIO YRA EFEKTYVIAUSIA?

Kai kosulys lengvas ir žmogus kosėja rečiau nei kas valandą, papildomų vaistų gerti nebūtina. Pakanka tik vartoti daugiau skysčių, drėkinti patalpas, atlikti inhaliacijas. Tokiais atvejais taip pat labai tinka įvairių vaistažolių arbatos, kurias pagal skonį galima pagardinti medumi, citrina ar imbiero griežinėliu. Medus taip pat slopina kosulį, turi antibakterinių savybių ir padeda organizmui lengviau kovoti su infekcija.

„Ramunėlių arbata geriausiai įveikia kosulį, ramunėlių nuoviras tinka ir gerklei skalauti, mėtų arbata taip pat padeda kovoti su tokiais peršalimo simptomais kaip gerklės skausmas, sloga, kosulys ir karščiavimas. Tačiau nėščiosioms šių vaistažolių rekomenduočiau vengti, taip pat ir čiobrelių arbatos. Šaltalankių arbata labai tinka sergant plaučių uždegimu, kai kamuoja įsisenėjęs kosulys, kartais šaltalankių nauda prilyginama antibiotikų poveikiui. Liepžiedžių arbata veikia panašiai kaip vaistai nuo kosulio, nes stimuliuoja bronchų liaukų sekreciją, lengvina atsikosėjimą. Aviečių arbata, taip pat aviečių lapų arbata ne tik mažina skausmą ir karščiavimą, bet ir gydo kosulį“, – vaistažolių arbatas vardija I. Pociulienė.

Kol kosulys sausas, ji pataria gerti islandinės kerpenos, paprastųjų saldymedžių šaknų, vaistinių svilarožių šaknų, tūbių žiedų arbatas ir jų mišinius. Jei kosėjama drėgnai, tuomet reikia rinktis vaistinių čiobrelių, pušų pumpurų, raudonėlių, siauralapių gysločių vaistažoles.

ACC®

PASIRŪPINSIME KOSULIU, KAD PASIRŪPINTUMĖTE SAVO DIENA

- skystina klampias gleives kvėpavimo takuose
- padeda jas pašalinti
- palengvina atsikosėjimą

1 X DIENĄ*

*** ACC Long 600 mg šnypščiosios tabletės. Nereceptinis vaistinis preparatas.**
Veikliosios medžiagos, stiprumas: vienoje ACC Long 600 mg šnypščiojoje tabletėje yra 600 mg acetilcisteino. **Indikacijos:** gleivių skystinimas sergant ūminėmis ar lėtinėmis bronchų bei plaučių ligomis, kurių metu būna sutrikusi gleivių gamyba bei šalinimas. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** vyresniems kaip 14 metų pacientams skiriama po 300 mg acetilcisteino 2 kartus per parą arba 1 kartą per parą 600 mg acetilcisteino. Tabletę reikia gerti ištirpintą stiklinėje vandens. **Kontraindikacijos:** ACC Long negalima vartoti, jeigu yra padidėjęs jautrumas acetilcisteinui arba kitoms sudedamosioms medžiagoms, esant lėtinei skrandžio ir dvylikapirštės žarnos opai, sunkiam astmos paūmėjimui. **Specialūs įspėjimai:** acetilcisteino vartojimas, ypač ankstyvojo gydymo metu, gali skatinti bronchų sekreto skystėjimą ir tokiu būdu jo tūrio didėjimą. ACC Long negalima vartoti jaunesniems nei 14 metų vaikams. „Sandoz Pharmaceuticals d.d." filialas, Šeimyniškių g. 3A LT-09312 Vilnius, Lietuva. Tel. +370 5 2636037. El.paštas: info.lithuania@sandoz.com.

BS2009226996. Teksto parengimo data: 2020 09 22.

SANDOZ A Novartis Division

-50 %

~~7,98 €~~

3,99 €

AMBIO LACTO-BIFIDO BAKTERIJŲ KOMPLEKSAS EKSTRA

20 kapsulių

MAISTO PAPILDAS

Papildo kasdienę mitybą gyvybingomis bakterijomis.
Vartojimas: vaikams nuo 12 metų ir suaugusiems vartoti 1–2 kapsules iki 3 kartų per dieną valgio metu. Vaikams nuo 3 iki 12 metų vartoti 1–2 kapsules per dieną valgio metu. Kapsules užgerti stikline vandens.

Perkant pakuotę – antra tokia pati DOVANŲ!

1+1

ACIDOLAC®

ACIDOLAC® BABY, lašai, 10 ml
ACIDOLAC® JUNIOR, 20 meškiuko formos tablečių
ACIDOLAC ®JUNIOR, braškių skonio, 20 meškiuko formos tablečių
ACIDOLAC®, 3 g, 10 pakelių

MAISTO PAPILDAI

Acidolac® Baby lašų sudėtyje esanti bakterijų **Lactobacillus rhamnosus GG ATCC 53103** padermė yra sutelkta mikrokapsulėse taikant šiuolaikines mikrokapsulavimo technologijas. **Skirtas naujagimiams, kūdikiams ir vaikams.** Rekomenduojama paros dozė- 5 lašai per parą. Be karvės pieno baltymo, laktozės ir glitimo.
Acidolac®Junior meškiuko formos tabletės – produktas, sujungiantis probiotinių bakterijų **Lactobacillus acidophilus ir Bifidobacterium lactis** padermes ir fruktooligosacharidus (FOS). Vartojimas: vyresniems kaip 3 metų amžiaus vaikams ir suaugusiems vartoti po 1 tabletę du kartus per parą. Be sacharozės, glitimo. Naujiena- **Acidolac®Junior braškių skonio meškiuko formos tabletės.** Jo sudėtyje yra vitamino B6, kuris padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą.
Acidolac® sudėtyje yra liofilizuotų pieno rūgšties bakterijų padermės **Lactobacillus rhamnosus GG** ir prebiotikų fruktooligosacharidų (FOS). Vartojimas: vyresniems nei 3 metų vaikams ir suaugusiesiems: 1–2 pakelliai per parą. Be karvės pieno baltymo, laktozės, gluteno ir sacharozės.

2,99 €

ESANT VIDURIAVIMUI

LOPERAMIDUM WZF POLFA 2 mg, 10 tablečių

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Veikliosios medžiagos: loperamido hidrochloridas. **Indikacijos**: simptominis suaugusių ir vyresnių nei 12 metų paauglių ūminio viduriavimo gydymas tokiu atveju, jei negalima pašalinti viduriavimą sukėlusios priežasties. **Dozavimas**: pradžioje geriama 2 tabletės (4 mg), vėliau – po 1 tabletę (2 mg) po kiekvieno išsituštinimo nesuformuotomis išmatomis. Draudžiama per parą gerti daugiau kaip 6 tabletes (12 mg). **Kontraindikacijos**: Padidėjęs jautrumas loperamido hidrochloridui arba bet kuriai pagalbinei medžiagai; jaunesni negu 12 metų pacientai; paralyžinis žarnų nepraeinamumas; vidurių užkietėjimas; pilvo pūtimas; organizme per mažai skysčio; pseudomembraninis kolitas, kurį dažniausiai sukelia plataus poveikio antibiotikai; ūminė bakterinė dizenterija, bei kitoks bakterinis viduriavimas. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės**: loperamido hidrochloridu gydomas pacientas turi vartoti pakankamai vandens bei mineralinių medžiagų.Šio vaistinio preparato reikia atsargiai vartoti ligoniams, kuriems yra kepenų nepakankamumas. Sergant Krono liga, loperamido hidrochlorido reikia vartoti atsargiai. Jeigu pasireiškia vidurių užkietėjimas, pilvo pūtimas ar atsiranda pirmųjų žarnyno obstrukcijos simptomų, šio vaistinio preparato vartojimą būtina nutraukti. Jeigu ligonis karščiuoja bei jo išmatose yra kraujo, prieš pradedant vartoti loperamido hidrochlorido, būtina išsiaiškinti tokio viduriavimo priežastį. Vartojant loperamido hidrochlorido, gali pasunkėti šlapinimasis. Šio vaistinio preparato negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas retas paveldimas sutrikimas – Lapp laktazės stygius arba gliukozės ir galaktozės malabsorbcija.
Reklamos teksto parengimo data 2017-01.

GREITAI SUSTABDYS VIDURIAVIMĄ.

-30 %

IR GINTARINE.LT



KEPENIMS

LEVEREN 30 tablečių

MAISTO PAPILDAS

Daržinio artišoko ekstraktas *padeda palaikyti normalią kepenų funkciją, normalią lipidų apykaitą. **Trūkažolės šakų ekstraktas** *padeda palaikyti normalią virškinimo sistemos veiklą. **Vitaminas B_6** padeda palaikyti normalią baltymų ir gliukogeno, homocisteino apykaitą, normalų raudonųjų kraujo kūnelių susidarymą, padeda mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį. **Folio rūgštis** padeda mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį.
*- EFSA-Q-2008-4424, EFSA-Q-2010-00256, EFSA-Q-2008-3918.

-30 %

IR GINTARINE.LT

VIRŠKINIMO SISTEMAI IR KEPENIMS

AKTYVINTOJI ANGLIS SU PIPIRMĖČIŲ EKSTRAKTU 10 kapsulių

MAISTO PAPILDAS

Aktyvintosios anglies ir augalinių ekstraktų kompleksas. Sudėtyje yra pipirmečių ekstrakto, padedančio palaikyti virškinimo sistemos ir kepenų veiklą, žarnyno peristaltiką. Aktyvintoji anglis padeda sumažinti per didelį dujų kaupimąsi pavalgius. Teigiamas poveikis pasireiškia suvartojus ne mažiau kaip 8 kapsules.

Perkant pakuotę – antra tokia pati DOVANŲ!

1+1

VIRŠKINIMUI IR KEPENIMS

VERDIN

VERDIN GASTRO, 10 plėvele dengtų tablečių
VERDIN GASTRO, 30 plėvele dengtų tablečių
VERDIN HEPAR, 24 plėvele dengtos tabletės
VERDIN HEPAR, 48 plėvele dengtos tabletės
VERDIN GASTRO TEA, arbata, 20 maišelių
VERDIN GASTRO TEA EARL GREY, arbata, 20 maišelių

MAISTO PAPILDAI IR ARBATOS

„Verdin Gastro" – augalinių ekstraktų derinys virškinimo sistemai su 40 kartų geriau pasisavinamu ciberžolių ekstraktu. Rozmarinų ekstraktas padeda palengvinti riebalų virškinimą, palaiko kepenų ir tulžies pūslės funkcijas. Artišokų ekstraktas padeda palaikyti normalią virškinimo sistemos funkciją. Vartojimas: gerti po 1–2 tabletes 2 kartus per dieną prieš arba po valgio. „Verdin Gastro" arbatos – žolelių kompozicija virškinimo sistemai, jų sudėtyje esantys pipirinių mėtų lapai palaiko normalią virškinimo sistemos funkciją, o kalendrų lapai padeda palaikyti normalią dujų pusiausvyrą virškinimo trakte.
„Verdin Hepar" – koncentruoti augaliniai ekstraktai kepenims. Tikrųjų margainių (silimarino šaltinis) ir dažinių ciberžolių ekstraktai padeda palaikyti kepenų funkciją, o CAVACURMIN® junginys pagerina kurkumino įsisavinimą iki 40 kartų. Vartojimas: gerti po 2–4 tabletes per dieną prieš arba po valgio.

„VERDIN" – GERAS VIRŠKINIMO RECEPTAS.

KAULAMS, SĄNARIAMS

-40%
~~7,98 €~~
4,79 €

AMBIO SĄNARIAMS
60 tablečių
MAISTO PAPILDAS

Maisto papildo sudėtyje yra gliukozamino, chondroitino ir vitamino C.
Vitaminas C padeda palaikyti normalų kolageno, kuris reikalingas normaliai kremzlių bei kaulų funkcijai, susidarymą.

-30%
~~9,98 €~~
6,99 €

Atnaujinta pakuotė

AMBIO OSTEO COMPLEX 60 tablečių
MAISTO PAPILDAS

-30%
IR GINTARINE.LT



PLACTIVE PROGEN 20 paketėlių
MAISTO PAPILDAS

Fermentų hidrolizuotas kolagenas;
Plazmos proteinas;
HC15® kompleksas: hialurono rūgštis, chondroitino sulfatas;
L-askorbo rūgštis (vitaminas C).

-25%
IR GINTARINE.LT

IMUNITETUI, KAULAMS, RAUMENIMS, SVEIKOMS LĄSTELĖMS

OILESEN D3

OILESEN VITAMINAS D3 80 kapsulių
OILESEN VITAMINAS D3 400 10 ml
OILESEN forte VITAMINAS D3 4000 60 kapsulių
OILESEN VITAMINAS D3 4000 su juodųjų ikrų aliejumi 40 kapsulių
MAISTO PAPILDAI

„Oilesen D3" – tai reikiamas vitamino D kiekis, ištirpintas natūraliame aliejuje.
„Oilesen D3 400" – vitaminas D su alyvuogių aliejumi kūdikiams ir mažiems vaikams. Paprasta dozuoti pipete.
„Oilesen D3 Forte" 1 kapsulėje yra net 4000 TV vitamino D3 ir kanapių aliejaus, kuris padeda palaikyti normalią imuninę sistemą ir raumenų funkciją.
Naujiena! „Oilesen D3 su juodųjų ikrų aliejumi" – 4000TV vitamino D ir juodųjų ikrų aliejaus nauda gerai savijautai. Vitaminas D padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą, normalią kaulų būklę, normalią raumenų funkciją. Vitaminas D atlieka tam tikrą funkciją ląstelių dalijimosi procese.

DAUGIAU SAULĖS SU „OILESEN D3"!

-25%
IR GINTARINE.LT

BIOCALCIUM 600MG FORTE pulv. 30 pak.
BIOGLUCOSAMINE MARINE 1500mg milt. 20 pak.
BIOGLUCOSAMINE MARINE 1500mg milt. 60 pak.
BIOKALCIS 1200MG+VIT.K milt. 15 pak.
OLD PHARM CALCIUM CITRATE GLUCOSAMINUM +VIT.D3+ROSA CANINA pulv. 70g
MAISTO PAPILDAI

Kalcis reikalingas kaulų ir dantų būklei palaikyti, padeda palaikyti normalią raumenų veiklą, nervų impulso perdavimą, virškinimo fermentų veikimą bei energijos apykaitą.
„bioCalcium forte 600 mg" – 1 miltelių pakelyje yra 600 mg gryno kalcio (citrato formoje) ir vitamino D.
„bioGlucosamine Marine 1500mg" – natūralios jūrinės kilmės gliukozamino sulfatas! 1 paketėlyje net 1500mg natūralios kilmės gliukozamino su kalciu ir vitaminais C, D!
„bioKalcis + fosforas + vit. D ir K" – pakelyje net 1200 mg gryno kalcio! Produkte naudojama žaliava - kalcio fosfatas – kuriame yra didelis kiekis gryno kalcio ir nėra jokių alergenų.
„Old Pharm Calcium citrate Glucosaminum +Vit.D3+Rosa canina pulv. 70 g" - kalcis, gliukozaminas, erškėtrožės ekstraktas ir vitaminas D: Kaulams ir sąnariams!
Sudėtyje – tik aktyviosios medžiagos: be konservantų, be stabilizatorių, be kvapiųjų medžiagų ar saldiklių.

GAMTOS ĮKVĖPTI MINERALAI MILTELIAIS IŠ IZRAELIO!

10,39 €

SĄNARIAMS

GLUCOSAMIN-RATIOPHARM 1,5 g miltelių geriamajam tirpalui, 20 paketėlių
NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Veikliosios medžiagos, stiprumas: viename paketėlyje yra 1,5 g gliukozamino sulfato. **Indikacijos: lengvo ar vidutinio sunkumo kelio osteoartrito sukeltų simptomų lengvinimas. Vartojimo būdas ir dozavimas: Paketėlio turinį ištirpinti stiklinėje vandens ir gerti vieną kartą per parą.** Miltelius galima vartoti tiek valgio metu, tiek nevalgant. Gliukozaminas netinka vartoti ūminio skausmo simptomų slopinimui. Gliukozamino negalima vartoti jaunesniems kaip 18 metų vaikams ir paaugliams. Kontraindikacijos. Padidėjęs jautrumas gliukozaminui arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Nevartoti alergiškiems kiaukutiniams moliuskams ir vėžiagyviams, nes iš jų gaunama pagrindinė preparato pagalbinė medžiaga. Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės. Preparato vartoti atsargiai, jei yra sutrikusi gliukozės tolerancija, turintiems širdies ir kraujagyslių ligų rizikos faktorių, sergant astma, fenilketonurija, nevartoti sergantiems paveldimu fruktozės netoleravimu.
Reklamos parengimo data: 2018-03-21.

JUDĖJIMUI BE SKAUSMO!

Nuolaidos galioja su vaistinės lojalumo kortelėmis.

Dolmen. **Nereceptinis vaistas. Veikliosios medžiagos.** Deksketoprofeno trometamolis (dexketoprofenum). Vienoje plėvele dengtoje tabletėje / granulių geriamajam tirpalui paketėlyje / geriamojo tirpalo paketėlyje yra 25 mg deksketoprofeno. **Vaisto forma.** Plėvele dengtos tabletės / granulės geriamajam tirpalui / geriamasis tirpalas paketėlyje. **Pakuotė.** Po 10 tabletčių / po 10 paketėlių granulių / po 10 geriamųjų tirpalų paketėlyje. **Indikacijos.** Dolmen vartojamas trumpalaikiam simptominiam lengvo ir vidutinio stiprumo ūminiam skausmui, tokiam kaip raumenų, sąnarių ir kaulų skausmui, skausmingų mėnesinių (dismenorėjos), dantų skausmui malšinti. **Dozavimas.** Atsižvelgiant į skausmo priežastis ir intensyvumą, rekomenduojama gerti: po 1 tabletę / paketėlį /geriamąjį tirpalą paketėlyje 1-3 kartus per parą kas 8 valandos. Didžiausia paros dozė neturi būti didesnė kaip 3 tabletės / paketėliai / geriamieji tirpalai paketėlyje. Jei esate senyvo amžiaus ar sergate inkstų, kepenų ligomis, pradėkite vartoti ne daugiau kaip 2 tabletes/ paketėlius / geriamuosius tirpalus paketėlyje per parą. **Vartojimo būdas.** Jei vartojate granules, visą paketėlio turinį ištirpinkite stiklinėje vandens, suplakite. Išgerkite nedelsiant. Geriamasis tirpalas paketėlyje gali būti geriamas tiesiai iš paketėlio. Jeigu jaučiate intensyvų skausmą ir reikia jį greičiau nuslopinti, vaistą vartokite prieš valgymą (ne vėliau kaip prieš 15-30 min.). Poveikis prasideda po 30 min. pavartojus vaisto. Skausmą malšinantis poveikis trunka 4-6 valandas. Šio vaisto neturėtų vartoti vaikai ir paaugliai (jaunesni kaip 18 metų). **Kontraindikacijos.** Padidėjes jautrumas deksketoprofenui, kitiems nesteroidiniams vaistams nuo uždegimo, aspirinui; vartojant ketoprofeno ar fi bratų buvę fotoalerginės ar fototoksinės reakcijos; pepsinė opa, buvęs kraujavimas iš virškinamojo trakto, lėtiniai virškinimo sutrikimai bei lėtinės virškinamojo trakto ligos; sunkus širdies nepakankamumas, vidutinio sunkumo arba sunkus inkstų funkcijos, sunkus kepenų veiklos sutrikimas; esant sunkiai dehidratacijai; neštumas bei žindymo laikotarpis. **Įspėjimai.** Vaistą atsargiai turi vartoti vyresnio amžiaus ligoniai, sergantieji alergija, astma, širdies, inkstų, kepenų ligomis, hipertenzija, sisteminė raudonoja vilklige, cukriniu diabetu, įvairiomis jungiamojo audinio ligomis, sutrikus kraujodarai; vartojant šlapimo išsiskyrimą skatinančius vaistus ar netekus daug skysčių. Pasitarkite su gydytoju jei vartojate kitų vaistų: geriamųjų steroidinių, nuo depresijos, apsaugančių nuo kraujo krešumo. Dolmen geriamojo tirpalo paketėlyje ir granulių geriamajam tirpalui paketėlyje yra sacharozės, todėl jeigu gydytojas Jums yra sakęs, kad netoleruojate kokių nors angliavandenių, kreipkitės į jį prieš pradėdami vartoti Dolmen granules geriamajam tirpalui ar geriamąjį tirpalą paketėlyje. Į tai turėtų atsižvelgti pacientai, sergantys cukriniu diabetu.

Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti Jūsų sveikatai. Jei simptomai nepraeina ar atsirado šalutinis poveikis, dėl tolesnio vaisto vartojimo būtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku. Jeigu įtariate, kad Jums pasireiškė šalutinis poveikis, apie jį praneškite savo gydytojui, vaistininkui ar Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos el. paštu NepageidaujamaR@vvkt.lt arba kitais būdais, kaip nurodyta jos interneto svetainėje www.vvkt.lt

Reklama paruošta: 2020 m. rugpjūčio mėn.

LT_DOL_16_2020_V1

ŠIRDŽIAI, KRAUJOTAKAI

-40 %
~~7,99 €~~
4,79 €

AMBIO AUGALINIS KOMPLEKSAS ŠIRDŽIAI
30 kapsulių
MAISTO PAPILDAS

Gudobelė, alyvmedis, česnakas
Papildo organizmą augalinėmis medžiagomis: gudobelių, alyvmedžių lapų bei česnakų ekstraktais. Gudobelė padeda palaikyti normalią širdies ir kraujagyslių sistemos veiklą.

-40 %
~~5,99 €~~
3,59 €

AMBIO ŠIRDŽIAI
40 tablečių
MAISTO PAPILDAS

Tiaminas padeda palaikyti normalią širdies veiklą.
Vitaminas B_6 padeda palaikyti normalią nervų sistemos veiklą.
Vitaminas E padeda apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės pažaidos.

1,69 €

ŠIRDŽIAI
VALIDOL SU GLIUKOZE
10 tablečių
MAISTO PAPILDAS

Su cukrais
6-iose tabletėse yra: 0,36 g mentilvalerato (*Methyl Valerate* 24–30,5 % tirpalas, levomentolio tirpalas izovalerijonų rūgšties mentilo esteryje) (RMV (referencinė maistinė vertė) nenustatyta); **0,38 g gliukozės**.

-50 %
~~13,98 €~~
6,99 €

ŠIRDŽIAI
AMBIO OMEGA-3 CARDIO
60 kapsulių
MAISTO PAPILDAS

Omega-3 ir vitaminai E, B_6, B_{12}, folio rūgštis. Maisto papildo sudėtyje esantys: DHR ir EPR padeda palaikyti normalią širdies veiklą. Teigiamas poveikis pasireiškia per parą suvartojant 250 mg EPR ir DHR. Vitaminai B_6 ir B_{12} padeda palaikyti normalų raudonųjų kraujo kūnelių susidarymą, normalią homocisteino apykaitą, normalią nervų sistemos veiklą, normalią energijos apykaitą ir padeda mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį. Foliatai padeda palaikyti normalią kraujodarą bei normalią psichologinę funkciją. Vitaminas E padeda apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės pažaidos.

0,20 €

KALCIO ŠALTINIS
KALCIO GLIUKONATAS 500 mg, 10 tablečių
MAISTO PAPILDAS

Kalcis svarbus normaliai raumenų veiklai, kaulų, dantų būklei palaikyti, svarbus normaliam kraujo krešėjimui.

Perkant pakuotę – antra tokia pati DOVANŲ!

1+1

BIOKALIS FORTE, 30 paketėlių
MAISTO PAPILDAI

Grynas kalio citratas! Kalis padeda palaikyti normalų kraujospūdį. Jis svarbus normaliai nervų sistemos ir raumenų veiklai palaikyti. „bioKalis 400 mg" sudėtyje esantis kalis yra citrato formos, miltelių pavidalu. Sudėtyje – 100 % kalio citratas: be konservantų, be stabilizatorių, be kvapiųjų medžiagų ar saldiklių. Tinka veganams, nėščiosioms ir maitinančioms moterims. Pagaminta Izraelyje.

KALIO CITRATAS MILTELIAIS!

Nuolaidos galioja su vaistinės lojalumo kortelėmis.

-25 %

IR GINTARINE.LT

MÖLLER'S

MAISTO PAPILDAI

Skysti žuvų taukai – tai šimtmečiais puoselėjama klasikinė žuvų taukų forma. „Möller's" žuvų taukų kapsulės išsiskiria kokybe, didele omega-3 koncentracija ir efektyvių medžiagų deriniais.
„Möller's D Vitamin Extra" kapsulės apvalkalas pagamintas naudojant „No-Flux" technologiją, užtikrinančią kapsulės medžiagų pasisavinimą be atsirūgimo ar žuvies kvapo. Vitaminas D padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą, kaulų, dantų būklę ir raumenų funkciją. Omega-3 riebalų rūgštys DHR ir EPR padeda palaikyti normalią širdies veiklą, per parą suvartojant 250 mg DHR ir EPR. Vitaminas K padeda palaikyti normalią kaulų būklę ir normalų kraujo krešėjimą.
TRADICINIS BŪDAS RŪPINTIS IMUNITETU.

1,49 €

ŠIRDIES IR KRAUJAGYSLIŲ FUNKCIJOMS GERINTI

ŠIRDIES LAŠAI VALENTIS

geriamieji lašai (tirpalas), 40 ml

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Veikliosios medžiagos, stiprumas: valerijonų tinktūra, sukatžolių tinktūra, gudobelių vaisių skystasis ekstraktas, 0,34 ml + 0,33 ml + 0,33 ml/ml. **Indikacijos:** tradicinis augalinis vaistinis preparatas, kurio indikacijos pagrįstos tik ilgalaikiu vartojimu, vartojamas širdies ir kraujagyslių funkcijoms gerinti, ypač esant nervinei įtampai. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** vartoti per burną. Iš pradžių, trís arba keturias dienas, reikia gerti 3–4 kartus per dieną po 20–30 lašų, vėliau dozę sumažinti (gerti 2–3 kartus per dieną po 15–20 lašų. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas bent vienai iš sudedamųjų vaisto dalių, nėštumas. **Specialūs įspėjimai:** vaistinio preparato nerekomenduojama naudoti jaunesniems nei 18 metų asmenims. Jeigu vartojant šį vaistą ilgiau kaip dvi savaites simptomai išlieka, būtina pasitarti su gydytoju ar kvalifikuotu sveikatos priežiūros specialistu. Jeigu vartojant preparato širdies plote atsiranda duriantis skausmas arba labiau sutrinka širdies ritmas, reikia nedelsiant kreiptis į gydytoją. Vaisto sudėtyje yra ne mažiau kaip 61,5 % (V/V) etanolio. **Reklaminio teksto parengimo data:** 2018-08-30.

IKI

-40 %

IR GINTARINE.LT

OMEGA-3 SUPER 1000, 30 kapsulių

ir 60 kapsulių

MAISTO PAPILDAI

Omega-3 riebalų rūgštys svarbios geram širdies ir kraujagyslių sistemos darbui. Sudėtyje esančios EPR ir DHR padeda palaikyti normalią širdies veiklą. Teigiamas poveikis pasireiškia per parą suvartojant 250 mg EPR ir DHR.
KAD ŠIRDIS NEPAILSTŲ DIRBTI!

ŽUVŲ TAUKAI 500 MG, 50 kapsulių

MAISTO PAPILDAS

Žuvų taukai skirti papildyti mitybą polinesočiosiomis riebalų rūgštimis. Ypač rekomenduojamos žmonėms, mažai valgantiems žuvies.

-20 %

IR GINTARINE.LT

FEROGLOBIN, FEROGLOBIN PLUS

FEROGLOBIN, 30 kapsulių, 200 ml

FEROGLOBIN PLUS, 200 ml

MAISTO PAPILDAI

„Feroglobin" – geležies, vitaminų ir mineralų kompleksas normaliai kraujodarai (foliatai), raudonųjų kraujo kūnelių gamybai (vitaminai B6, B12, geležis), hemoglobino susidarymui (geležis) palaikyti. „Feroglobin" pulkiai papildo mitybą nėštumo ir laktacijos laikotarpiu, valkystėje ir paaugłystėje, sveikstant po ligos ar operacijos.
„Feroglobin Plus" ne tik papildo geležies atsargas, bet ir padeda mažinti pavargimo jausmą (vitaminai B6 ir B12), palaiko fizinę ir protinę energiją (sibirinis ženšenis).
GELEŽIS, KURIAI NĖRA LYGIŲ!

-40 %

IR GINTARINE.LT

KARDIOKALIS

KARDIOKALIS, 60 tablečių

MAISTO PAPILDAI

„Kardiokalyje" esantys mineralai:
kalis:
- padeda palaikyti normalų kraujospūdį;
- padeda palaikyti normalią raumenų veiklą;

magnis:
- padeda mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį;
- padeda palaikyti normalią nervų sistemos veiklą bei psichologinę funkciją.

Apvalkalėliu dengtos „Kardiokalio" tabletės nedirgina skrandžio gleivinės. Tabletėje esantys mikroelementai išsiskiria iš lėto – taip užtikrinamas ilgalaikis ir tolygus jų pasisavinimas.

Perkant pakuotę - antra tokia pati DOVANŲ!

1+1

BIOFERRUM ACEROLA, 28 pak.

MAISTO PAPILDAS

Unikalus tirpios geležies maisto papildas miltelių pavidalu su vitaminu C (ekologiška acerola). Geležis padeda palaikyti normalų raudonųjų kraujo kūnelių ir hemoglobino susidarymą. Geležis ir vitaminas C padeda mažinti nuovargį, palaikyti normalią energijos apykaitą, imuninės sistemos veiklą. Sudėtyje – tik aktyviosios medžiagos: be konservantų, be stabilizatorių, be kvapiųjų medžiagų ar saldiklių. Pagaminta Japonijoje.
150% GELEŽIES DIENOS NORMOS!

SMEGENŲ IR NERVŲ SISTEMAI

-30 %

IR GINTARINE.LT

MAGNE B6

MAGNE B6 FAST, 20 vienadozių paketėlių
MAGNE B6 SLEEP, 30 kapsulių
MAGNE B6 STRESS RESIST, 15 kapsulių

MAISTO PAPILDAI

„Magne B6 Fast" (su saldikliu) yra malonaus citrinų skonio, burnoje tirpstantys miltelliai, kuriuos galima vartoti be vandens. Šis produktas aprūpina organizmą vitaminais B6 bei B9, kurie yra labai svarbūs esant stresinei aplinkai. Magnis ir vitaminas B6 padeda mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį. Vitaminas B9 padeda palaikyti normalią psichologinę funkciją. „Magne B6 Fast" sudėtyje nėra cukraus. Vartojimas: rekomenduojamos paros dozės: 6–13 metų vaikams: 1 paketėlis per dieną, vyresniems kaip 14 metų vaikams ir suaugusiesiems: 2 paketėliai per dieną. Specifinių vartojimo laiko ir trukmės rekomendacijų nėra. Turinį užberti tiesiai ant liežuvio. Vandens nereikia.
„Magne B6 Sleep" padeda palaikyti normalų miegą. Vartojimas: suaugusiesiems gerti po 2 kapsules vakare. Kapsules vartoti likus pusei valandos ar valandai prieš miegą. Jeigu reikia, vieną iš dviejų kapsulių galima išgerti vakare anksčiau. Vartojimo trukmė: 3 savaitės. Maisto papildas nerekomenduojamas krūtinės vėžiu sirgusioms moterims. „Magne B6 Stress Resist" – rausvosios rodiolės (100 proc. augalinės kilmės sudedamoji dalis) padeda palaikyti normalią organizmo būklę streso metu. Magnis, vitaminas B6 ir folio rūgštis (vitaminas B9), padeda mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį bei palaikyti normalią psichologinę funkciją. Vartojimas: suaugusiesiems vartoti po 1 tabletę per dieną užsigeriant didele stikline vandens. Rekomenduojama vartojimo trukmė 30 dienų. Jeigu reikia, vartojimą galima atnaujinti Jums patogiu laiku. Nėštumo ir žindymo laikotarpiu maisto papildą galima vartoti tik pasitarus su gydytoju. Teksto parengimo data: 2020-02. Reklamos teksto parengimo data: 2020-02. SALT.MGP.20.02.0021

IKI

-30 %

IR GINTARINE.LT

NEUROZAN

NEUROZAN, 30 tablečių -30 %
NEUROZAN PLUS, 56 tabletės/kapsulės -20 %

MAISTO PAPILDAI

NEUROZAN – platus ir subalansuotas kompleksas normaliai protinei (pantoteno rūgštis) ir nervų sistemos (jodas, magnis, ir kt.) veiklai palaikyti. Vitaminai B1, B3 ir kt. palaiko normalią psichologinę būklę, o geležis ir cinkas - pažinimo funkciją. Naujiena – sudėtis papildyta ginkmedžių ekstraktu ir 5 HTP.

NEUROZAN PLUS – dviguba pakuotė su omega-3 riebiosiomis rūgštimis.

PAMAITINK SAVO PROTĄ!

-30 %

IR GINTARINE.LT

NERVŲ SISTEMAI

KORVALOOL-P tirpalas, 25 ml

MAISTO PAPILDAS

60-yje lašų (rekomenduojamame suvartoti per parą kiekyje) yra: izovalerijonorūgštiesmentiloesterio – 183,60 mg, mentolio – 123 mg, α-bromizovalerijono rūgšties etilo esterio – 112,5 mg, pipirinės mėtos aliejaus – 7,80 mg, apynių aliejaus – 5,55 mg. RMV (referencinė maistinė vertė) – nenustatyta.
Sudėtyje yra alkoholio – 55 %.

NUO

6,55 €

KRAUJOTAKAI IR ATMINČIAI

GINKOBIL 80 mg, 40 kietųjų kapsulių 6,55 €
GINKOBIL 120 mg, 40 kietųjų kapsulių 8,99 €

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Veikliosios medžiagos stiprumas: 1 kietojoje kapsulėje yra 80/120 mg rafinuoto ir kiekybiškai įvertinto ginkmedžių lapų sausojo ekstrakto. Indikacijos: lengvo ir vidutinio smegenų kraujotakos nepakankamumo, pasireiškiančio susilpnėjusia atmintimi ir dėmesio koncentracija, spengimu ar ūžimu ausyse, svaiguliu ar galvos skausmu, simptominiam gydymui. Vartojimo būdas ir dozavimas: gerti po 1 kapsules 2–3 kartus per dieną (atitinka 160–240 mg dienos dozę). Kontraindikacijos: vartoti negalima, jei yra padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei „Ginkobil" medžiagai. Specialūs įspėjimai: kadangi dviskiaučių ginkmedžių lapų ekstrakto poveikis depresinei nuotaikai ir galvos skausmui, nesusijusiems su silpnaprotystės sindromu, kol kas nėra pakankamai ištirtas, medikamentu gydyti šiuos simptomus galima tik laikantis visų būtinų atsargumo priemonių. Tekto peržiūros data 2017-05-22

VEIKSMINGAI GERINA SUTRIKUSIĄ KRAUJOTAKĄ!

-30 %

IR GINTARINE.LT

MAGNIS PLIUS B_{12} IR C

21 paketėlis

MAISTO PAPILDAS SU SALDIKLIAIS

Žalių citrinų skonio burnoje tirpstančios granulės.
Magnis, Vitaminas B_{12}, Vitaminas C padeda palaikyti:
- normalią energijos apykaitą,
- normalią nervų sistemos veiklą bei psichologinę funkciją,
- padeda mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį.

Magnis
- padeda palaikyti normalią raumenų funkciją bei normalią kaulų ir dantų būklę.

Vitaminas B_{12}
- padeda palaikyti normalų raudonųjų kraujo kūnelių susidarymą, padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą.

Vitaminas C
- padeda palaikyti normalų kolageno, kuris reikalingas normaliai dantų funkcijai, susidarymą.
- padeda apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės pažaidos bei padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą.



-40 %

IR GINTARINE.LT

NEURO BALANCE

30 kapsulių

MAISTO PAPILDAS

NEURO BALANCE sudėtyje yra **valerijono, melisos, apynių, pasifloros ekstraktų ir B grupės vitaminų.**

Vitaminai B_1, B_6, B_{12}, niacinas padeda palaikyti normalią nervų sistemos veiklą.
Vitaminai B_1, B_2, niacinas padeda palaikyti normalią psichologinę funkciją.
Vitaminai B_1, B_{12}, niacinas padeda mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį.
Vitaminas B_2 ir niacinas padeda palaikyti normalią energijos apykaitą.
Vitaminas B_2 padeda apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės pažaidos.

Nuolaidos galioja su vaistinės lojalumo kortelėmis.

Onkologinės ligos - tikras iššūkis.

KARTU MES STIPRESNI

Su POLA kortele nuolaidos:
15% vaistams*
20% kitoms prekėms*

*Nuolaidos netaikomos perkant su kompensuojamuoju receptu, vardinius, kartinius vaistus, pradinio maitinimo mišinius, administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Nuolaidos nesumuojamos.

Gintarinė vaistinė

Mums gera jumis rūpintis

NUO
1,75 €

NUO SKAUSMO
IR KARŠČIAVIMO

APAP

APAP, 500 mg, 12 plėvele dengtų tablečių 1,75 €
APAP, 500 mg, 24 plėvele dengtos tabletės 3,25 €
APAP, 250 mg granulės paketėlyje, vaikams, 10 paketėlių 5,25 €

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Veikliosios medžiagos, stiprumas: paracetamolis, 250 mg ir 500 mg. Indikacijos: vaistai skirti silpnam ir vidutinio stiprumo skausmui malšinti ir temperatūrai mažinti. Vartojimo būdas ir dozavimas: „Apap, 500 mg" plėvele dengtos tabletės: suaugusiesiems ir vyresniems kaip 12 metų vaikams gerti po 1–2 tabletes kas 4–6 valandas, ne daugiau kaip 8 tabletes per parą. „Apap, 250 mg" granulių paketėliuose, skirtų vaikams, vienkartinė dozė yra nuo 10 iki 15 mg/kg kūno svorio vyresniems nei 4 metų vaikams, ją vartoti ne dažniau kaip kas 4 valandos (didžiausia paros dozė – 4 paketėliai). Granules supilti tiesiai į burną ant liežuvio ir praryti neužgėrus vandens. Kontraindikacijos: vaistus vartoti draudžiama, jei yra padidėjęs jautrumas bet kuriai vaisto sudedamajai medžiagai, inkstų ar kepenų veiklos nepakankamumas. Specialūs įspėjimai: prieš vartojant paracetamolį būtina pasitarti su gydytoju, jei yra: pažeistos kepenys ar inkstai, astma, gliukozės-6-fosfatdehidrogenazės stoka, hemolizinė anemija, vartojami kai kurie kiti vaistai, skysčių netekimas, mitybos nepakankamumas, vartojamas alkoholis bei neštumo ir žindymo laikotarpiu. Didesnės nei rekomenduojamos dozės sukelia vidaus organų pažeidimus.
Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti Jūsų sveikatai. Jei simptomai nepraeina ar atsirado šalutinis poveikis, dėl tolesnio vaisto vartojimo būtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku. Reklaminio teksto parengimo data: 2019-09-02.

„APAP". KIEKVIENOJE VAISTINĖLĖJE.

3,49 €

NUO SPAZMŲ

NO-SPA 40 mg, 24 tabletės

Drotaverino hidrochloridas

SANOFI

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 tabletėje yra 40 mg drotaverino hidrochlorido. **Indikacijos:** lygiųjų raumenų spazmai, susiję su tulžies takų ligomis: tulžies pūslės ir (arba) latakų akmenlige, tulžies pūslės ir (arba) latakų uždegimu, inkstų ar šlapimtakių akmenligės, inkstų geliminiu, šlapimo pūslės uždegimo sukeltas šlapimo takų lygiųjų raumenų spazmas, meškuoniškas noras šlapintis. **Kaip pagalbinė priemonė:** prasidėjus skrandžio ir žarnyno lygiųjų raumenų spazmams, jei yra skrandžio ir dvylikapirštės žarnos opa, skrandžio, plonosios ar storosios žarnos uždegimas, įskrandžio ir prievarčio spazmas; skausmingos menesinės. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** suaugę žmonės – 120–240 mg per parą (3–6 tabletės), išgerti per 2–3 kartus; vaikai – drotaverino poveikis vaikams klinikiniuose tyrimuose tirtas nebuvo. **Kontraindikacijos:** alergija (padidėjęs jautrumas) drotaverinui arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Sunkus kepenų, inkstų ir širdies nepakankamumas (mažo pajėgumo sindromas). Tablečių negalima vartoti jaunesniems kaip 1 metų vaikams. **Specialūs įspėjimai:** jei kraujospūdis mažas, vaistą reikia vartoti labai atsargiai. Jeigu gydytojas Jums yra sakęs, kad netoleruojate kokių nors angliavandenių, kreipkitės į jį prieš pradėdami vartoti šį vaistą. Drotaverino vartojant su levodopa, mažėja pastarojo vaisto poveikis parkinsonizmui. **Teksto parengimo data:** 2017 m. birželio mėn. **Reklamos teksto parengimo data:** 03/2020. SALT.DRT.20.03.0033

KAI KANKINA SPAZMAI – VARTOKITE NO-SPA!

8,99 €

CANIFUG CREMOLUM 200 mg, 3 makšties ovulės

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Vienoje ovulėje yra 200 mg klotrimazolo. „Canifug Cremolum" vartojamas mieliagrybių (dažniausiai baliošvagrybių) sukeltam makšties uždegimui gydyti. Ligai pasireiškus pirmą kartą arba jeigu liga pasireiškė dažniau nei 4 kartus per pastaruosius 12 mėnesių, vaisto galima vartoti tik gydytojui nurodžius ir jam prižiūrint. **Dozavimas.** Jeigu nenurodoma kitaip, 1 „Canifug Cremolum" ovulę (tai atitinka 200 mg klotrimazolo) įkiškite kuo giliau į makštį vieną kartą per parą, vakare. Vaistinio preparato nerekomenduojama vartoti vaikams, nes klinikinės patirties nepakanka bendroms dozavimo rekomendacijoms šiai amžiaus grupei nustatyti. Senyvoms pacientėms dozės koreguoti nereikia. Dažniausiai pakanka 3 dienų gydymo šuo vaistiniu preparatu kursu. Pirmėkus galima paskirti antrą 3 dienų trukmės gydymo kursą. **Vartojimo metodas.** „Canifug Cremolum" – tai ovulė, skirta vartoti į makštį. Geriausia „Canifug Cremolum" įkišti vakare, gulint ant nugaros šiek tiek sulenktomis kojomis. Norėdami išimti ovulę iš pakuotės, nuplėškite plėvelę traukdami ją žemyn; naudokite atidarymą palengvinantį įtaisą – V formos plevelės įpjovą. Po to galima ovulę išstumti. Norint išvengti riebalų dėmių susidarymo ant drabužių, ovulių vartojimo metu į kelnaites reikia įsidėti įklotą. **Kontraindikacijos.** Padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. **Specialių atsargumo priemonių reikia:** jei esate nėščia, manote, kad galbūt esate nėščia, arba planuojate pastoti; jeigu vartojami dezodorantai ar intymiosios higienos priemonės; juos galima naudoti tik pasitarus su gydytoju, nes gali sumažėti „Canifug Cremolum" veiksmingumas; jeigu yra paraudimas, dilgčiojimas, niežėjimas, išskyros iš makšties ir skausmingas makšties uždegimas, tai taip pat gali būti sukelta veiksnių, kurių „Canifug Cremolum" neveikia. Tik gydytojas gali nustatyti teisingą diagnozę; kai tuo pačiu metu vartojate „Canifug Cremolum" ir lateksо produktus (pvz., prezervatyvus, diafragmas), nes dėl sudėtyje esančių pagalbinių medžiagų (ypač stearatų) gali būti sumažintas šių produktų veiksmingumas ir jie tampa mažiau patikimi. **Įspėjimai.** Geriausia gydytis ne menesinių metu ir (arba) gydymą baigti prieš menesinių pradžią. Gydyti menesinių metu galima tik esant sunkiems klinikiniams simptomams. Dėl to kreipkitės į gydytoją. Nėštumo metu gydymą gali skirti tik gydytojas. Jeigu Jums kartu nustatyta lytinių lūpų ir aplinkinių sričių grybelių sukelta infekcija, ir (arba) jeigu Jūsų partneriui nustatyta varpos galvutės arba apyvarpės grybelinė infekcija, reikia papildomai vartoti vietinį gydymą. Siekiant išvengti galimos pakartotinės infekcijos, tuo pat metu reikia medicininiškai tirti partnerį. Reklamos teksto parengimo data 2020 03 12.

-20 %

IR GINTARINE.LT

FONIX® EAR PAIN purškalas, 15 ml

MEDICINOS PRIEMONĖ

Pirmoji pagalba pasireiškus dažnoms ausų problemoms, tokioms kaip:
- skausmas
- infekcijos
- susikaupusi siera
- dirginimas

„Fonix® Ear Pain" yra medicinos priemonė, kurios sudėtyje yra augalinių aliejų mišinio, skirto ausiai apsaugoti nuo dažnų problemų ir jas palengvinti.
Sudėtis: alyvuogių aliejus, indinių sezamų aliejus, gulsčiųjų serenojų ekstraktas, fitosterolių kompleksas, bisabololis, kvapiųjų murėjų lapų aliejus, ceiloninių cinamonų lapų aliejus, vingrūnių ekstraktas, mėtų aliejus.
Suaugusiesiems ir vyresniems kaip 3 metų vaikams.
Vartojimas: purkšti po 1–2 įpurškimus į kiekvieną ausį 3 kartus per parą.

6,49 €

TRUMPALAIKIAM PIENINIŲ DANTŲ DYGIMO SUKELTAM SKAUSMUI IR UŽDEGIMUI MAŽINTI

DENTINOX burnos gleivinės gelis, 10 g

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Veikliosios medžiagos: 1 g yra: 150 mg ramunėlių tinktūros, 3,4 mg lidokaino hidrochlorido 1H2O, 3,2 mg polidokanolio 600. **Terapinės indikacijos:** profilaktiškai skausmui ir uždegimui slopinti dygstant pirmiesiems dantukams. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** esant pirmiems dantukų dygimo požymiams, nedidelį žirnelio dydžio želės „Dentinox®-Gel N" gumulėlį švariu pirštu ar vatos tamponėliu atsargiai užtepti ant skaudamos vietos ir lengvai įtrinti. Šią procedūrą kartoti 2–3 kartus per dieną, ypač po valgio ir prieš miegą. **Kontraindikacijos:** jei padidėjęs jautrumas ramunėlėms ar kitoms, į sudėtį įeinančioms, medžiagoms. Jei parausta dantenos ar patinsta gleivinė, atsiranda kitų požymių, reikia kreiptis į gydytoją. **Specialūs įspėjimai:** kai vartojate vaistą, reikia saugotis, kad jo nepatektų į akis. Reklaminio teksto parengimo data 2017-02-20.

KAD PIRMIEJI DANTUKAI DYGTŲ NESKAUSMINGAI!

9,99 €

ZOVIDUO 50 mg/10 mg/g kremas, 2 g

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Indikacijos. Lūpų ir odos aplink lūpas pūslelinės ankstyvųjų simptomų gydymas suaugusiesiems ir 12 metų bei vyresniems paaugliams. **Vartojimas.** Tepti ant pažeistos vietos 5 k. per dieną, kas 3–4 val.; iki 5 parų. **Kontraindikacijos.** Alergija aciklovirui, valaciklovirui, hidrokortizonui ar bet kuriai pagalbinei medžiagai; kitoms nei pūslelinės odos infekcijoms. **Specialūs įspėjimai.** Nevartoti prieš pat valgį ar su bet kokiais tvarsčiais ar pleistrais. Netepti akių, nosies ir burnos ertmės, lytinių organų. Nevartoti, jei imuninė sistema sutrikusi ar susilpnėjusi. Pasitarti su gydytoju, jei kartojasi sunki pūslelinė ar pasireiškė bet kokių regėjimo sutrikimų. Sudėtyje yra propilenglikolio, cetostearilo alkoholio ir natrio laurilsulfato. Teksto parengimo data 2019 spalio 30 d. NP-LT-VOLT-20-00001

Nuolaidos galioja su vaistinės lojalumo kortelėmis.

NUO **1⁹⁹ €**

NUO SKAUSMO IR KARŠČIAVIMO

IBUPROM

IBUPROM, 200 mg, 10 dengtųjų tablečių 1⁹⁹ €
IBUPROM, 200 mg, 20 dengtųjų tablečių 2⁹⁹ €
IBUPROM, 400 mg, 10 plėvele dengtų tablečių 2⁴⁹ €
IBUPROM, 400 mg, 20 plėvele dengtų tablečių 3⁴⁹ €
IBUPROM EXPRESS, 400 mg, 20 minkštųjų kapsulių 4⁹⁹ €

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Veikliosios medžiagos, stiprumas: ibuprofenas, 400 mg ir 200 mg. Indikacijos: skausmo malšinimas, karščiavimo mažinimas. Vartojimo būdas ir dozavimas: „Ibuprom Express, 400 mg“: suaugusiems pacientams ir vyresniems nei 12 m. vaikams kaip trumpalaikis pagalbinis gydymas kas 4 val. geriama 1 kapsulė (negerti daugiau kaip 3 kapsulių per parą); „Ibuprom, 400 mg“: suaugusiesiems ir vyresniems kaip 12 m. vaikams gerti po 1 plėvele dengtą tabletę 3 kartus per parą. Jaunesniems kaip 12 m. vaikams vartoti negalima; „Ibuprom, 200 mg“: 6–9 m. vaikams (kūno svoris 20–29 kg) vartoti po 1 tabletę kas 6–8 val. po valgio. Negalima vartoti daugiau nei 3 tabletes per parą (didžiausia paros dozė – 600 mg, vartojant per kelis kartus). 10–12 m. vaikams (kūno svoris 30–39 kg) vartoti po 1 tabletę kas 6 val. po valgio. Negalima vartoti daugiau nei 4 tabletes per parą (didžiausia paros dozė – 800 mg, vartojant per kelis kartus). Dozavimas suaugusiesiems ir vyresniems kaip 12 m. vaikams – pradinė dozė yra 2 tabletės, užgeriant vandeniu. Po to, jei būtina, rekomenduojama gerti po 1–2 tabletes kas 4 val. Negalima vartoti daugiau kaip 6 tablečių (1 200 mg) per 24 val. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas bet kuriai vaisto sudedamajai medžiagai, taškinis kraujavimas, ūminės skrandžio ir dvylikapirščio žarnos opaligės stadija; anksčiau buvusi alergija acetilsalicilo rūgščiai ir kitiems nesteroidiniams vaistams nuo uždegimo; sergant sunkiu širdies nepakankamumu; esant trečiam nėštumo trimestrui. Specialūs įspėjimai: vartoti nepatartina, jei sergate inkstų ar kepenų nepakankamumu, bronchų astma. Teksto parengimo data 2020-05-04.

YRA „IBUPROM“. NĖRA SKAUSMO.

NUO **5³⁹ €**

KEPENIMS

LIVOSIL

140 mg, 30 kapsulių 5³⁹ €
140 mg, 60 kapsulių 9⁴⁹ €

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 kietojoje kapsulėje yra 140 mg silimarino. **Indikacijos:** papildomas lėtinio hepatito, kepenų cirozės ir toksinio kepenų pažeidimo gydymas. **Vartojimo būdas ir dozavimas:** suaugusiems žmonėms rekomenduojama „Livosil“ dozė yra 280–420 mg per parą. Gerti po 1 kapsulę (140 mg) 2–3 kartus per dieną. Kapsulių nekramtyti, užgerti nedideliu kiekiu skysčio. „Livosil“ rekomenduojama vartoti ilgiau nei 3 mėnesius. **Kontraindikacijos:** padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei „Livosil“ medžiagai. **Specialūs įspėjimai:** silimarinas gali mažinti gliukozės koncentraciją kraujyje. Todėl rekomenduojama stebėti pacientus, sergančius cukriniu diabetu ar su sumažėjusia gliukozės koncentracija kraujyje (hipoglikemiją), bei tuos, kurie vartoja preparatų, maisto papildų ar kitokių produktų, darančių įtaką gliukozės koncentracijai. Teksto peržiūros data 2017-07-12.

NATŪRALI KEPENŲ APSAUGA IR GYDYMAS!

-40 %

IR GINTARINE.LT

MAKŠTIES MIKROFLOROS ATSTATYMUI

ECOCILLIN ORAL 15 kapsulių

MEDICINOS PRIEMONĖ

Ecocillin Oral geriamųjų kapsulių sudėtyje yra 5 milijardai probiotinių pieno rūgšties bakterijų (Lactobacillus plantarum P17630, Lactobacillus paracasei I1688, Lactobacillus salivarius I1794), kurias išgėrus, jos iš žarnyno migruoja į maištes aplinką ir tokiu būdu skatina maištes infekcijų simptomų (nemalonaus kvapo, paraudimo, niežulio, skausmo pojūčio) išnykimą ir padeda užkirsti kelią pasikartojančioms infekcijoms. Vartojant Ecocillin Oral fiziologinė žarnyno ir maištes ekosistema apribinama atitinkamomis laktobakterijų rūšimis, kurios prisitvirtina prie gleivinės ir sukuria apsauginį barjerą nuo patogeninių mikroorganizmų sukeliamų ligų.

NUO **4⁴⁹ €**

VIRŠKINIMO SISTEMAI

GUTTALAX

GUTTALAX, 7,5 mg/ml geriamieji lašai (tirpalas), 15 ml 4⁴⁹ €
GUTTALAX, 7,5 mg/ml geriamieji lašai (tirpalas), 30 ml 6⁹⁹ €
(Natrio pikosulfatas)

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

1ml tirpalo (15 lašų) yra 7,5 mg natrio pikosulfato. **Indikacijos.** Trumpalaikis vidurių užkietėjimo mažinimas, tuštinimosi lengvinimas. **Dozavimas ir vartojimo metodas.** Guttalax geriamas vakare. Suaugusiesiems ir vyresniems nei 10 metų vaikams: 10-20 lašų per parą. 4-10 metų vaikams: 5–10 lašų per parą. Vartoti per burną. Rekomenduojama gydymą pradėti mažiausia doze. Didžiausios rekomenduojamos paros dozės viršyti negalima. **Kontraindikacijos.** Padidėjęs organizmo jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai; žarnų nepraeinamumas ar obstrukcija; stiprus pilvo skausmas ir (arba) karščiavimas dėl ūminės pilvo būklės (pvz., apendicito), galimai susijęs su pykinimu, vėmimu; ūminė uždegiminė žarnų liga; sunki dehidratacija; jaunesni kaip 4 metų vaikai; retos paveldimos būklės, kurios gali būti nesuderinamos su preparato pagalbine medžiaga. **Specialūs įspėjimai.** Nenustačius vidurių užkietėjimo priežasties, negalima vartoti nepertraukiamai kasdien ar ilgai. Guttalax pavartojusiems žmonėms buvo galvos svaigimo ir (arba) sinkopės atvejų. Vaikams be gydytojo nurodymo Guttalax vartoti negalima. Negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas fruktozės netoleravimas.
Teksto parengimo data: 2017 m. spalio mėn. Reklaminio teksto parengimo data: 11/2020. MAT-LT-2000335 V 1.0

UŽKIETĖJUS VIDURIAMS VEIKIA PATIKIMAI IR NIEKAM NEPASTEBINT.

Pasiūlymai galioja **2021 01 01 – 2021 01 31.**

Leidinyje nurodytos maisto papildų, medicininės paskirties prekių ir medicinos prietaisų kainos galioja su vaistinės lojalumo kortelėmis, o vaistinių preparatų kainos galioja visiems perkantiems. Nuolaidos nesumuojamos ir netaikomos kitose akcijose dalyvaujančioms prekėms. Akcijoje dalyvaujančių prekių kiekis ribotas. Leidinyje kainos nurodytos su nuolaida. Jei leidinyje kainos ar kita informacija nesutampa su kainomis ar informacija, esančia vaistinėse, prašome tai vertinti kaip spaudos klaidą.

Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti Jūsų sveikatai. Jei simptomai nepraeina ar atsirado šalutinis poveikis, dėl tolesnio vaisto vartojimo būtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku.

Jeigu įtariate, kad Jums pasireiškė šalutinis poveikis, apie jį praneškite savo gydytojui, vaistininkui ar Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos el. paštu NepageidaujamaR@vvktu.lt arba kitais būdais, kaip nurodyta jos interneto svetainėje www.vvkt.lt.

Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Neviršykite nustatytos rekomenduojamos dozės. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Daugiau informacijos GINTARINĖJE vaistinėje, tel. 8 800 10008, www.gintarine.lt MAŽYLIUI IR MAMAI skirtas prekes ypatingomis kainomis greičiau ir patogiau užsisakykite internetinėje vaistinėje www.gintarine.lt. Užsisakius prekių (išskyrus vaistinius preparatus) už 28,96 € ir daugiau – pristatymas NEMOKAMAS! Reklaminio teksto parengimo data – 2020 12 18.

GERAI SAVIJAUTAI

-35 %

~~5,99 €~~

3,89 €

Atnaujinta pakuotė

AMBIO VITAMINAS B_{12}

60 tablečių

MAISTO PAPILDAS

500 µg Vitamino B_{12}

Vitaminas B_{12}:

- padeda palaikyti normalią energijos apykaitą, normalią nervų sistemos veiklą, normalią psichologinę funkciją.
- padeda mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį.
- padeda palaikyti normalią imunines sistemos veiklą.
- padeda palaikyti normalų raudonųjų kraujo kūnelių susidarymą.
- atlieka tam tikrą funkciją ląstelių dalijimosi procese.

IKI

-30 %

Atnaujinta pakuotė

AMBIO PATIRIANTIEMS ĮTAMPĄ 100 ml ~~6,99~~ 4,89 € -30 %

AMBIO PATIRIANTIEMS ĮTAMPĄ 20 kapsulių ~~6,98~~ 5,58 € -20 %

SKYSTASIS MAISTO PAPILDAS IR MAISTO PAPILDAS

Ramunių, valerijonų, apynių ekstraktai ir melatoninas.
Melatoninas padeda mažinti subjektyvų laiko juostų skirtumo pajautimą. Teigiamas poveikis pasireiškia suvartojant ne mažiau kaip 0,5 mg prieš einant miegoti pirmą kelionės dieną ir kelias dienas po atvykimo į kelionės tikslo vietą. Melatoninas padeda mažinti laiko, reikalingo norint užmigti, trukmę. Teigiamas poveikis pasireiškia suvartojant 1 mg melatonino prieš einant miegoti.
Paprastųjų apynių ekstraktas gali padėti atpalaiduoti.

IKI

-30 %

IR GINTARINE.LT

RAUMENIMS, SĄNARIAMS IR ODAI

DR. THEISS

DR. THEISS, kaulažolių tepalas su vitaminu E, 50 g -25 %
DR. THEISS, kaulažolių šildantis kremas, 50 g -25 %
DR. THEISS, kaulažolių gelis, 100 g -30 %

KOSMETIKOS PRIEMONĖS

Kaulažolių tepalas „Dr. Theiss" su vitaminu E dėl sudėtyje esančio atkuriamosiomis ypatybėmis išsiskiriančio alantoino (išgauto iš kaulažolių ekstrakto) tinka nugarai, raumenims, sąnariams įtrinti, nuovargiui pašalinti, taip pat sumušimams, patempimams, odos pažeidimams, skilinėjantiems kulnams prižiūrėti. Sudėtyje esantis vitaminas E prasiskverbia pro ląstelių membranas, pagerina ląstelių maitinimą.
Taip pat galima riniktis šildomąjį kaulažolių kremą „Dr. Theiss" su Kajeno paprikomis ir rozmarinų eteriniu aliejumi, kuris sušildo odą ir skatina kraujo apytaką, padeda pašalinti įtampą, jaučiamą nugaros ir pečių juostos raumenyse, atsikratyti nemalonių pojūčių po fizinių krūvių.
Gelis ypač tinka sportininkams, jis greitai įsigeria, nepalieka riebių dėmių, turi malonų vėsinamąjį poveikį.
Kaulažolių tepalas „Dr. Theiss" pagamintas pagal originalią seną receptūrą.

KAULAŽOLIŲ PREPARATAI „DR. THEISS" – SENOLIŲ IŠMINTIS!

-40 %

~~10,99 €~~

6,59 €

AMBIO OMEGA-3 STRONG

60 kapsulių

MAISTO PAPILDAS

Omega-3 iš žuvų taukų: 350 mg EPR (eikozapentaeno rūgšties) ir 250 mg DHR (dokozaheksaeno rūgšties). DHR padeda palaikyti normalią smegenų funkciją ir išsaugoti normalų regėjimą. Teigiamas poveikis pasireiškia per parą suvartojant 250 mg DHR. DHR ir EPR padeda palaikyti normalią širdies veiklą. Teigiamas poveikis pasireiškia per parą suvartojant 250 mg EPR ir DHR. Vitaminas E padeda apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės pažaidos.

PIGU

1,69 €

GLICIN

100 mg, 50 tablečių

MAISTO PAPILDAS

Vartojimas: vartoti po 1 tabletę 3 kartus per dieną. Tabletę laikyti po liežuviu kol ištirps.
Gamintojas: MNPK Biotiki, Rusija.

-30 %

IR GINTARINE.LT

IMMUNO POSITIVE, 30 tablečių

MAISTO PAPILDAS

Tikrųjų alavijų lapai, juodavaisių aronijų vaisiai, paprastųjų aviečių vaisiai, stambiauogių spanguolių vaisiai, paprastųjų eršketių vaisiai, juodųjų eleuterokokų šaknys, vitaminai ir mineralai.
Vartojimas: rekomenduojama vartoti po 1 tabletę per parą.

Nuolaidos galioja su vaistinės lojalumo kortelėmis.

Gintarinė vaistinė

IKI -40%

PREPARATAMS AKIMS

Pasiūlymas galioja **2021 01 01 - 2021 01 31**, perkant vaistinėje, pateikus šias korteles: MYLIMIAUSIA, GINTARINĖ arba IKI PREMIJA. Nuolaidos nesumuojamos ir netaikomos kitų akcijų prekėms. Nuolaida taikoma prekėms, įtrauktoms į UAB „Gintarinė vaistinė“ administracijos patvirtintą prekių sąrašą. UAB „Gintarinė vaistinė“ pasilieka teisę bet kada keisti akcijos sąlygas. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.

-40 %

IR GINTARINE.LT

IMUNITETUI IR GERAI SAVIJAUTAI

NEW NORDIC MULTIVITAMINAI

MAISTO PAPILDAI

Skandinavų bendrovės „New Nordic" multivitaminai – tai puikiai suderinti vitaminų, mineralų, mikroelementų ir augalinių ekstraktų kompleksai imunitetui ir gerai savijautai. **„Multivitamin active woman"** – moterims, besirūpinančioms gera savijauta ir gražiu. **„Multivitamin active woman 55+"** – vyresnių moterų organizmo poreikiams. **„Multivitamin pregnant and breastfeeding woman"** – besilaukiančioms moterims ir žindyvėms. **„Multivitamin active man"** – vyrams, o **„Folkepillen"** – multivitaminai su augaliniais ekstraktais imunitetui. Nepamirškome ir mažųjų – „Mineralai kaulams", apelsinų arba miško uogų skonio kramtomosios tabletės – kalcio, magnio ir vitamino D šaltinis augančiam organizmui. **„Multi vegan GUMMIES"** – gaivaus vaisių ir uogų skonio multivitaminai guminukai imunitetui. Tinka visai šeimai, taip pat vegetarams ir veganams. Sudėtyje esantys vitaminai A, C, D padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą.

JAUSKITĖS PUIKIAI!

-30 %

IR GINTARINE.LT

ERŠKĖTUOGIŲ SIRUPAS 250 g

MAISTO PAPILDAS, SU CUKRUM

Papildomas vitamino C šaltinis. Vitaminas C padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą, padeda mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį, gerina geležies absorbciją.

-30 %

IR GINTARINE.LT

DOCTOR FISH OMEGA-3 + VITAMINS D & E

30 kapsulių

MAISTO PAPILDAS

Su saldikliu

Maisto papildo sudėtyje yra omega-3 riebalų rūgščių (EPR ir DHR) ir vitaminų D ir E:

- EPR (eikozapentaeno rūgštis) ir DHR (dokozaheksaeno rūgštis) padeda palaikyti normalią širdies veiklą;
- DHR padeda palaikyti normalią smegenų funkciją, išsaugoti normalų regėjimą;
- vitaminas D padeda palaikyti imuninės sistemos veiklą, normalią kaulų, raumenų, dantų būklę;
- vitaminas E padeda apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės pažaidos.

Teigiamas poveikis pasireiškia per parą suvartojant 250 mg EPR ir DHR.

-30 %

IR GINTARINE.LT

PIPIRINIS PLEISTRAS, 1 vnt.

Pleistro sudėtyje yra „Capsicum", 1 g (atitinka ne mažiau kaip 0,1 mg/cm2).
Išoriniam naudojimui.

EMILI, 6 garstyčių trauklapiai

1 garstyčių trauklapyje–pakete yra 3 g natūralių maistinių garstyčių miltelių.
Išoriniam naudojimui.

-40 %

IR GINTARINE.LT

NAKVIŠŲ ALIEJUS 100 kapsulių

MAISTO PAPILDAS

Vienoje kapsulėje yra net 1000 mg nakvišų aliejaus, kuris gaminamas šalto spaudimo būdu, todėl jame išlieka daugiau naudingų medžiagų. Nakvišų aliejus – polinesočiųjų riebalų rūgščių šaltinis. Jame yra ypač daug linoleno ir gama linoleno rūgščių bei kitų medžiagų.
Vartojimas: gerti po 1 kapsulę per dieną.

MOTERS ŽAVESIO PASLAPTIS IŠ GAMTOS!

Nuolaidos galioja su vaistinės lojalumo kortelėmis.

-40 %

IR GINTARINE.LT

ACONITUM

MAISTO PAPILDAI

AUKŠTOS KOKYBĖS LIETUVIŠKI PREPARATAI, KURIUOS SUKŪRĖME JUMS

-40 %

IR GINTARINE.LT

DOPPELHERZ®

MAISTO PAPILDAI

Granulės su vitaminu C ir cinku IMUNINEI SISTEMAI.
Net 5 skirtingi skoniai karštam/ šaltam gėrimui. Šaltuoju metų laiku šis karštas gėrimas suteikia šilumą iš vidaus. Be laktozės. Be glitimo.

"DOPPELHERZ ®" – DVIEJŲ ŠIRDŽIŲ JĖGA!

-25 %

IR GINTARINE.LT

MAGNESIUM CITRATE, 50 pakelių
KALIUM CITRATE, 50 pakelių
STOPOROSE, 50 pakelių

MAISTO PAPILDAI

NAUJIENA! Net 50 pakelių vienoje pakuotėje, didelės dozės viename pakelyje. Mineralai citratų formos, geras biologinis įsisavinimas. **„Magnesium Citrate"** – 375 mg magnio viename pakelyje, **„Kalium Citrate"** – 500 mg kalio puséje pakelio, **„Stoporose"** – kalio (300 mg) ir kalcio (800 mg) citrato derinys! Moksliškai pagrįsta, kad kalio citratas svarbus ir naudingas kaulams po menopauzės, kalcis padeda lėtinti moterų po menopauzės kaulų mineralinio tankio mažėjimą. Produktų sudėtyje nėra konservantų, stabilizatorių ar dažiklių. Pagaminta Izraelyje.

MINERALAI MILTELIAIS IŠ IZRAELIO.

-40 %

IR GINTARINE.LT

OBUOLIŲ SIDRAS SU IMBIERU 60 kapsulių

MAISTO PAPILDAS

Obuolių sidras su imbieru – papildo organizmą augalinės kilmės medžiagomis

-25 %

IR GINTARINE.LT

ZIPPY® VITAMINAI PAAUGLIAMS IR PANELĖMS

30 kapsulių

MAISTO PAPILDAI

100% subalansuota vitaminų ir mikroelementų vertė per parą.
Vienoje kapsulėje esantys:
Geležis padeda palaikyti normalų hemoglobino susidarymą;
Vitaminai B, ir B_6 padeda palaikyti normalią nervų sistemos veiklą;
Vitaminas B_2 padeda išsaugoti normalų regėjimą;
Vitaminas B_5 padeda palaikyti normalią protinę veiklą, padeda mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį;
Vitaminas B_{12} padeda palaikyti normalų raudonųjų kraujo kūnelių susidarymą;
Folio rūgštis padeda palaikyti normalią psichologinę funkciją ir imuninės sistemos veiklą;
Cinkas padeda palaikyti normalią kaulų, plaukų, nagų ir odos būklę, išsaugoti normalų regėjimą.

100 % SUBALANSUOTA PAAUGLIAMS

TRYS ŽUIKIAI VIENU ŠŪVIU

* Net 360 kokybės kontrolės etapų

100 metų patirties

Pagaminti Kanadoje



Pagaminta klevų šalyje

Maisto papildai. www.jamieson.lt

-40 %

IR GINTARINE.LT

AKIMS IR REGĖJIMUI

BLUE BERRY™ 60 tablečių, kapsulių arba guminukų

MAISTO PAPILDAI

Švediškų **„New Nordic"** vitaminų akims ir regėjimui **„Blue Berry"**, **„Blue Berry Omega-3"**, **„Blue Berry Plus Eyevitamin"**, **„Blue Berry Gummies"** ir **„Blue Berry Eye Stress"** sudėtyje yra mėlynių, akišveičių ekstraktų, liuteino. Mėlynių uogų ekstraktas padeda palaikyti normalų regėjimą. Vaistinių akišveičių ekstraktas padeda palaikyti normalias regėjimo ir tinklainės funkcijas. **„Blue Berry Omega-3"** sudėtyje papildomai yra omega-3 riebalų rūgščių – EPR (eikozapentaeno rūgšties) ir DHR (dokozaheksaeno rūgšties), taip pat vitamino A ir cinko. Vitaminas A ir cinkas padeda išsaugoti normalų regėjimą. DHR padeda išsaugoti normalų regėjimą, kai jos per parą suvartojama 250 mg.

ŠVEDIŠKI VITAMINAI AKIMS!

-30 %

IR GINTARINE.LT

ABC VIT VITAMINAS C

ABC VIT VITAMINAS C, 500 mg, ananasų skonio, 50 tablečių
ABC VIT VITAMINAS C, 500 mg, apelsinų skonio, 50 tablečių
ABC VIT VITAMINAS C, 500 mg, braškių skonio, 50 tablečių

MAISTO PAPILDAI

Su saldikliais.
Vitaminas C padeda palaikyti normalią imuninės ir nervų sistemos veiklą, padeda mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį, apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės pažaidos. **Vartojimas:** suaugusiesiems po 1–2 tabletes per dieną.

-20 %

IR GINTARINE.LT

FITOLIZYNA NEFROCAPS PLUS 30 kapsulių

MAISTO PAPILDAS

„Fitolizyna Nefrocaps PLUS" yra unikalus 7 koncentruotų augalinių ekstraktų mišinys, kuris:
– padeda palaikyti normalią inkstų ir šlapimo takų veiklą (petražolių šaknys, dirvinių asiūklių žolė, paprastųjų varpučių šakniastiebiai, karpotųjų beržų lapai, vaistinių gelsvių šaknys, paprastųjų rykštenių žolė);
– padeda palaikyti normalų vandens pašalinimą iš organizmo, todėl skatinamas nepageidaujamų metabolizmo produktų šalinimas su šlapimu (dirvinių asiūklių žolė, paprastųjų varpučių šakniastiebiai, vaistinių gelsvių šaknys, paprastųjų rykštenių žolė).

Rekomenduojamas vartojimas: 1 kapsulė 2 kartus per parą prieš valgį, užgeriant dideliu kiekiu vandens (ne mažiau kaip ½ stiklinės).

PIGU



1,89 €

UNDEVIT 50 dražečių

MAISTO PAPILDAS

Tai A, C, E ir B grupės (B_1, B_2, B_6, B_{12}) vitaminų bei niacino, rutino, pantoteno rūgšties, folio rūgšties preparatas. Vitaminai C ir A padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą, vitaminas E padeda apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės pažaidos, vitaminas B_1 (tiaminas) padeda palaikyti normalią širdies veiklą, vitaminas B_2 (riboflavinas) padeda išsaugoti normalų regėjimą, vitaminas B_6 (piridoksinas) padeda mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį, vitaminas B_{12} (cianokobalaminas) padeda palaikyti normalų raudonųjų kraujo kūnelių susidarymą, niacinas padeda palaikyti normalią psichologinę funkciją, pantoteno rūgštis padeda palaikyti normalią protinę veiklą. Vartojimas: gerti po 1 dražetę per dieną.
Gamintojas: „Marbiofarm", Rusija.



Perkant pakuotę – antra tokia pati DOVANŲ!

1+1

ACTAVIT

ActaVit Omega-3 žuvų taukai, 1000 mg, 60 kapsulių
ActaVit nakvišų aliejus, 1000 mg, 60 kapsulių
ActaVit A+E, 20 kapsulių

MAISTO PAPILDAI

„Actavit" Omega-3 žuvų taukų sudėtyje yra 150 mg eikozapentaeno rūgšties (EPR) ir 110 mg dokozaheksaeno rūgšties (DHR). Teigiamas poveikis širdžiai pasireiškia per parą suvartojus ne mažiau kaip 250 mg DHR ir EPR rūgščių. 250 mg DHR rūgšties padeda išsaugoti normalų regėjimą bei palaikyti normalią smegenų funkciją.
„Actavit" nakvišų aliejuje yra 1000 mg nakvišų (Oenothera biennis) aliejaus, kuriame yra 100 mg gama linoleno rūgšties ir 10 mg vitamino E (83 % rekomenduojamos referentinės maistinės vertės).
„Actavit A+E" sudėtyje yra 1500 µg vitamino A ir 67 mg vitamino E. Vitaminas A padeda palaikyti normalią geležies apykaitą ir normalią gleivinių bei odos būklę, padeda išsaugoti normalų regėjimą ir palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą, atlieka tam tikrą funkciją ląstelių specializacijoje. Vitaminas E – antioksidantas, padedantis apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės pažaidos.

GROŽIUI IR SVEIKATAI. VISAI ŠEIMAI.

GERAI SAVIJAUTAI

-25 %

IR GINTARINE.LT

WALMARK LINIJOS VITAMINAI IR MINERALAI VISAI ŠEIMAI

MAISTO PAPILDAI, MEDICINOS PRIEMONĖS

-35 %

IR GINTARINE.LT

KAULAMS IR GROŽIUI

KALCIS, MAGNIS, CINKAS FORTE SU VITAMINU D

30 tablečių
100 tablečių

MAISTO PAPILDAS

Kalcis, magnis, cinkas ir vitaminas D padeda palaikyti normalią kaulų būklę. Kalcis, magnis ir vitaminas D padeda palaikyti normalią dantų ir raumenų būklę. Cinkas padeda palaikyti normalią plaukų, odos ir nagų būklę.

-50 %

IR GINTARINE.LT

IMUNITETUI IR ENERGIJAI

SPEKTRUM ENERGY Q10

MAISTO PAPILDAS

21 vitaminas ir mineralas praturtinti Kofermentu Q10. Vitaminas B6 padeda palaikyti normalią energijos apykaitą. Vitaminai B2, B3, B5 ir B6 padeda mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį.

-30 %

IR GINTARINE.LT

GYVYBINGOSIOS BAKTERIJOS

SALUTIL 10 kapsulių

MAISTO PAPILDAS

Sudėtyje yra pieno rūgšties ir bifido bakterijų bei Saccharomyces boulardii mielių. Salutil maisto papildas tinka nėščioms ir krūtimi maitinančioms moterims. Nereikia laikyti šaldytuve, tinka kelionėms. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
LT.Sal.70821

-35 %

IR GINTARINE.LT

VYRAMS

PERMEN MAX 30 tablečių

MAISTO PAPILDAS

„Permen® Max" yra augalinių medžiagų derinys, papildytas L-argininu. Kininiai žeńšeniai padeda palaikyti normalią erekcijos funkciją.

-30 %

IR GINTARINE.LT

PROENZI ARTHROSTOP

MAISTO PAPILDAI IR KOSMETIKOS PRIEMONĖ

„Proenzi Arthrostop Intensive" – maistinių medžiagų kompleksas sąnariams. Baltųjų gluosnių (*Salix alba*) ir ciberžolių (*Curcuma longa*) ekstraktų derinys padeda palaikyti normalią sąnarių būklę ir lankstumą. Pluoštinių bosvelijų (*Bosvelia serrata*) žievių ekstraktas padeda palaikyti sąnarių lankstumą ir bendrą sąnarių būklę. Vitaminas C padeda palaikyti normalų kolageno, kuris reikalingas normaliai kaulų funkcijai, susidarymą.
„Proenzi Arthrostop Plus" sudėtyje yra gliukozamino ir MSM derinys kartu su žolelių ekstraktu iš pluoštinių bosvelijų ir manganu. Pluoštinių bosvelijų žievių ekstraktas padeda palaikyti sąnarių lankstumą ir bendrą sąnarių funkciją.
„Proenzi Arthrostop ASU" – avokadų ir sojų ekstrakto bei Robuvit® kompleksas. Vitaminas C padeda palaikyti normalų kolageno, kuris reikalingas normaliai kaulų ir kremzlių funkcijai, susidarymą.
Sąnarių mityba, jų lankstumo palaikymas ir bendras gyvybingumas.+ ASU neesterifikuotas avokadų ir sojų ekstraktas.
„Proenzi Arthrostop" – masažinis kremas, skirtas odai sąnarių srityje ir aplink sąnarius.
Prekių skaičius ribotas. LT.Proen.70214

PROENZI – JUDĖK LAISVAI.

Nuolaidos galioja su vaistinės lojalumo kortelėmis.

IKI
-35%
IR GINTARINE.LT

LIVOL VITAMINAI

MAISTO PAPILDAI

„Livol" – tai kasdienę mitybą papildantys vitaminų, mineralų ir augalų ekstraktų deriniai. Skandinaviška kokybė, unikali produktų sudėtis pagal kiekvieno organizmo poreikius, inovatyvi gamybos technologija – štai dėl ko milijonai žmonių pasitiki „Livol" produktais.

SKIRTINGIEMS POREIKIAMS – SKIRTINGI „LIVOL" VITAMINAI.

-30%
IR GINTARINE.LT

AKIMS

OPTIC TOTAL 30 tablečių
OPTIC SENIOR 30 tablečių
OPTIC BIOLUTEINA 25 30 tablečių

MAISTO PAPILDAI

OPTIC TOTAL sudėtyje yra mėlynių uogų, liuteino, cinko ir vitaminų C, E, A.
OPTIC SENIOR sudėtyje yra mėlynių uogų, vynuogių sėklų ekstrakto, liuteino, zeaksantino, cinko ir vitaminų C, E, A, B_6, B_2, B_1, B_9.
OPTIC BIOLUTEINA 25 –sudėtyje yra mėlynių uogų, vynuogių sėklų ekstrakto, liuteino, zeaksantino, cinko, seleno ir vitaminų: C, E, A, B_6, B_2, B_1, B_9.
VARTOJIMAS: po 1 tabletę per dieną.

3,69 €

PAIRA ALTAI MUMIO 30 tablečių

MAISTO PAPILDAS

2 tabletėse yra 400 mg išvalyto mumijaus. **Vartojimas:** suaugusiesiems rekomenduojama vartoti po 1 tabletę 2 kartus per dieną, valgio metu.

-30%
IR GINTARINE.LT

OMEGA-3 1000 MG PLUS VITAMIN D_3, E

60 kapsulių

MAISTO PAPILDAS

EPA (liet. EPR – eikozapentaeno rūgštis) ir DHA (liet. DHR – dokozaheksaeno rūgštis) padeda palaikyti normalią širdies veiklą. DHR (dokozaheksaeno rūgštis) padeda palaikyti normalią smegenų funkciją, išsaugoti normalų regėjimą.
Vitaminas D_3 padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą, normalią kaulų, dantų ir raumenų būklę.
Vitaminas E padeda apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės pažaidos.

-30%
IR GINTARINE.LT

VITAMINAS A (ABC VIT) 60 kapsulių
VITAMINAS A (ABC VIT) lašai, 10 ml
VITAMINAS A IR E 60 kapsulių
VITAMINAS E (ABC VIT) lašai, 10 ml
VITAMINAS E (ABC VIT) 60 kapsulių

MAISTO PAPILDAI

Vitaminas A padeda palaikyti normalią odos būklę, išsaugoti normalų regėjimą, palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą. Vitaminas E padeda apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės pažaidos.

-30%
IR GINTARINE.LT

ABC VIT VITAMINAS D-3, 100µg, 60 kapsulių
ABC VIT VITAMINAS D-3, 50µg, 60 kapsulių

MAISTO PAPILDAI

Vitaminas D padeda palaikyti normalią kaulų, dantų ir raumenų būklę, kalcio ir fosforo absorbciją ir (arba) įsisavinimą, normalią imuninės sistemos veiklą.

-40 %
~~11,99 €~~
7,19 €

AMBIO TRIBULUS 30 tablečių
MAISTO PAPILDAS
Gulsčiosios ragužės (Tribulus terrestris) padeda palaikyti lytinę funkciją.

-50 %
~~13,98 €~~
6,99 €

AMBIO NAKVIŠŲ IR AGURKLIŲ ALIEJUS ,60 kapsulių
MAISTO PAPILDAS

-30 %
IR GINTARINE.LT

MOTERIMS

ISEREN 30 tablečių
MAISTO PAPILDAS
Maisto papildas su gauruotosios sojos ekstraktu, kuriame gausu natūralių izoflavonų.
Vartojimas: po vieną tabletę per dieną.

FOLIO RŪGŠTIS
Folio rūgštis, 400 mcg, 30 tablečių
Folio rūgštis, 400 mcg, 270 tablečių
MAISTO PAPILDAI
Folio rūgštis padeda mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį. **Vartojimas:** po 1 tabletę per parą.

IKI
-35 %
IR GINTARINE.LT

AMEDIPLUS NĖŠTUMO TESTAI
AMEDIPLUS nėštumo testas, juostelė, 1 vnt. ~~1,09~~ 0,87 € -20 %
AMEDIPLUS nėštumo testas, kasetė, 1 vnt. ~~1,99~~ 1,49 € -25 %
AMEDIPLUS nėštumo testas, ypač ankstyvas/srovinis, 1 vnt. ~~5,02~~ 3,78 € -35 %
MEDICINOS PRIEMONĖS
Moteriai pastojus jos organizmas ima gaminti specifinį hormoną „Žmogaus chorioninį gonado tropiną" (ŽCG) tai yra glikoproteininis hormonas išskiriamas iškart po apvaisinimo besivystančios placentos. Nėštumo testas Amediplus yra skirtas nustatyti ŽCG šlapime. Kaip ir atliekant kitus testus, galutinę diagnozę nustato gydytojas. Testo tikslumas 99%, jautrumas 99%.

-35 %
IR GINTARINE.LT

PROVITAL
30 tablečių
MAISTO PAPILDAS
„Provital" sudėtyje yra gulsčiųjų serenojų vaisių ekstrakto, paprastųjų moliūgų sėklų aliejaus, didžiųjų dilgėlių lapų miltelių, gulsčiųjų ragužių vaisių ekstrakto, vitaminų, vario, cinko, seleno, likopeno, aminorūgščių.
Cinkas padeda palaikyti:
- normalų vaisingumą ir reprodukciją;
- normalią testosterono koncentraciją kraujyje.

Selenas padeda palaikyti:
- normalią spermatogenezę;
- normalią skydliaukės veiklą.

Varis padeda palaikyti:
- normalią imuninės sistemos veiklą;
- normalią plaukų ir odos pigmentaciją.

Vitaminas B_6 padeda reguliuoti hormonų aktyvumą bei padeda mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį.
Vitaminas E, varis ir selenas padeda apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės pažaidos.
Vartojimas: gerti po 1 tabletę per dieną. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas. Nevirškite nustatytos rekomenduojamos dozės. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.

-30 %
IR GINTARINE.LT

EVENING PRIMROSE 30 tablečių
MAISTO PAPILDAS
Dvimetės nakvišos ekstraktas yra polinesočiųjų riebalų rūgščių šaltinis, kuris padeda palaikyti normalią būklę menstruacijų periodo metu.
Vartojimas: suaugusiesiems gerti po 1 tabletę 3 kartus per parą, geriausiai po valgio.

Nuolaidos galioja su vaistinės lojalumo kortelėmis.

-50%

IR GINTARINE.LT

JAMIESON BIOTIN 5000 µg, 60 tablečių

Maisto papildas

- Biotinas padeda palaikyti normalią plaukų ir odos būklę.
- Net 5000 µg biotino 1 tabletėje.
- Skani, greitai tirpstanti vyšnių skonio tabletė.
- Pakuotės užtenka net 2 mėnesiams.

Pagaminta klevų šalyje

-40%

IR GINTARINE.LT

JAMIESON COLLAGEN 60 tablečių

Maisto papildas

- Per 28 dienas sumažėja raukšlių ir smulkių raukšlelių.
- Kovoja su senėjimo požymiais, gerina odos išvaizdą ir elastingumą.
- 3 tabletėse yra 2500 mg „VerisolTM“ hidrolizuoto kolageno.

Pagaminta klevų šalyje

-30%

IR GINTARINE.LT

JAMIESON VITAMINAI D

Jamieson vitaminas D guminukai, 1000 TV 60 guminukų
Jamieson vitaminas D vaikams, 400mg, TV
10µg kramt.tab. 100 tablečių
Jamieson Vitamino D lašai 1000IU 11,4ml
Jamieson Vitamino D lašai kūdikių 400IU 11,4ml
Jamieson D vitaminas kramtomas 1,000 IU 100 tablečių

Maisto papildai

Pagaminta klevų šalyje

Natūrali vaistinėje pagaminta kosmetika

ŽIEDĖ
PAGAMINTA VAISTINĖJE

Sudėtinės dalys – tai didžiausia rūpestingomis vaistininkų rankomis pagamintos kosmetikos ŽIEDĖ galia. Būtent natūraliuose ingredientuose slypi viskas, kas iš tiesų svarbiausia prižiūrint veido odą. ŽIEDĖ jungia vaistininkų žinias apie aromaterapiją, kosmetiką ir farmaciją. Be to ŽIEDĖ pakuotės – daugkartinio naudojimo - neišmeskite tuščio stiklinio indelio ŽIEDĖ. Atneškite jį į vaistinę ir naują gaminį ŽIEDĖ įsigykite pigiau. Tausokime gamtą drauge!

www.ziede.lt

-25 %

IR GINTARINE.LT

VEIDUI

BIODERMA HYDRABIO

KOSMETIKOS PRIEMONĖS

Begant metams ir veikiant agresyviems išorės veiksniams, odos ląstelės prasčiau aprūpinamos vandeniu, oda tampa sausa ir dehidratuoja. Todėl nepakanka „palaistyti" odą tradicine drėkinamąja priemone, kuri veikia tik odos paviršių. Norint atkurti odos skaistumą, būtinas intensyvus odos drėkinimas, kuris suaktyvina vandens cirkuliaciją ir giliousiuose odos sluoksniuose. „Bioderma" linija „Hydrabio" suaktyvina biologinę vandens apytaką visuose odos sluoksniuose, o sandaresnis paviršinis odos sluoksnis neleidžia jam išgaruoti. Oda pradeda funkcionuoti kaip sveika ir vėl šypti.

BIOLOGIJOS MOKSLAS DERMATOLOGIJAI.

-40 %

4,95 €

2,99 €

AMBIO GROŽIUI

30 kapsulių

MAISTO PAPILDAS

Vitaminas C padeda palaikyti normalų kolageno, kuris reikalingas normaliai odos funkcijai, susidarymą. Vitaminas A, riboflavinas (vitaminas B_2) ir biotinas padeda palaikyti normalią odos būklę.
Biotinas padeda palaikyti normalią odos ir plaukų būklę. Varis padeda palaikyti normalią odos ir plaukų pigmentaciją. Selenas padeda palaikyti normalią plaukų ir nagų būklę. Cinkas padeda palaikyti normalią plaukų, nagų ir odos būklę. Didžiosios dilgėlės lapų ekstrakte yra mineralų ir mikroelementų, kurie padeda stiprinti kaulų, nagų ir plaukų būklę. Dirvinio asiūklio žolės ekstraktas padeda palaikyti normalią odos, plaukų ir nagų būklę.

IKI

-35 %

IR GINTARINE.LT

VEIDO IR KŪNO PRIEŽIŪRAI

URIAGE

DERMATOLOGINĖ KOSMETIKA

Dermatologinė kosmetika „Uriage" gimsta Prancūzijos Alpių papėdėje. Ilgus metus kurta, pagrįsta moksliniais tyrimais, naudojama kasdien ir esant odos problemų.
Kūdikiams, vaikams, suaugusiesiems.

KIEKVIENO POREIKIAMS. VISAI ŠEIMAI.

-40 %

5,49 €

3,29 €

AMBIO RESVERATROL 100 MG

30 kapsulių

MAISTO PAPILDAS

„Ambio Resveratrol 100 mg" maisto papilde esančios medžiagos turi stiprių antioksidacinių savybių, padeda apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės pažaidos ir palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą.

-25 %

IR GINTARINE.LT

ODAI

BABÉ

KOSMETIKOS PRIEMONĖS

Įsileiskus „Babė" į savo namus, ji taps svarbia jūsų gyvenimo dalimi. Dermatologinė kosmetika „Babė" išsiskiria puoselėjamaja sudėtimi, pritaikyta net itin reikliai odai. Išsirinkite savo „Babė" kasdienei veido ar kūno odos priežiūrai, kūdikių ir vaikų odos priežiūrai, plaukams. Visi „Babė" produktai yra be parabenų, dažiklių, mineralinių alyvų ir alergenų turinčių kvapiųjų medžiagų. Hipoalerginiai, kruopščiai patikrinti dermatologų.

„BABĖ" – DALELĖ JŪSŲ GYVENIMO.

Perkant pakuotę - antra tokia pati DOVANŲ!

1+1

NORMALIAM KŪNO SVORIUI PALAIKYTI

NEW NORDIC

MAISTO PAPILDAI

Organizmui valyti – „BodyDrain". Sudėtyje esantis artišokų ekstraktas padeda palaikyti normalią kepenų veiklą ir žarnyno būklę, valyti organizmą. Kalorijų apykaitai – „Chili Burn". Sudėtyje esantis chromas padeda palaikyti normalią maistinių makromedžiagų apykaitą. Riebalų apykaitai – „Apple Cider 600". Sudėtyje esantis cholinas padeda palaikyti normalią lipidų apykaitą. Guminukai „Apple Cider GUMMIES" – skanus ir patogus būdas vartoti obuolių sidro actą. Riebalams deginti – „Fat Burner". Sudėtyje esantis cholinas padeda palaikyti normalią lipidų apykaitą ir kepenų veiklą, o paragvajiniai bugieniai (Yerba mate) padeda palaikyti normalų kūno svorį. Svoriui mažinti – „Coffee Diet". Sudėtyje esantis gliukomananas, laikantis sumažintos energinės vertės dietos, padeda mažinti svorį. Teigiamas poveikis pasireiškia prieš valgį suvartojant per parą 3 g gliukomanano (3 porcijomis po 1 g), kartu išgeriant 1–2 stiklines vandens, jei laikomasi sumažintos energinės vertės dietos.

BURNOS HIGIENAI

-25 %

IR GINTARINE.LT

JORDAN

Kiekvienas mūsų turime unikalius dantis, naudojame individualią jų valymo techniką, be to, mums patinka skirtingos spalvos ir stiliai. Atsižvelgiant į skirtingus vartotojų poreikius bei siekiant padėti efektyviai išvalyti burnos ertmę, „Jordan" siūlo plataus pasirinkimo dantų priežiūros priemonių linją vaikams bei suaugusiems. Su „Jordan"- tinkamiausią išsirinks kiekvienas!

„JORDAN" – JŪSŲ SVEIKAI IR GAIVIAI ŠYPSENAI!

IKI -30 %

IR GINTARINE.LT

JAUTRIŲ DANTŲ PRIEŽIŪRAI

SENSODYNE

BURNOS HIGIENOS PRIEMONĖS

Dantų pastos Sensodyne yra specialiai sukurtos žmonėms, turintiems jautrius dantis.
CHLT/CHMULBRA/0004/18a/JUL

EKSPERTO PAGALBA JAUTRIEMS DANTIMS.

-20 %

IR GINTARINE.LT

LISTERINE

BURNOS PRIEŽIŪROS PRIEMONĖS

Burnos skalavimo skysčiai „Listerine" veiksmingai naikina apnašas, apsaugo nuo dantenų uždegimo ir palaiko gaivų burnos kvapą. Pasiekdamas vietas, kurių dantų šepetėlis negali pasiekti, skystis sunaikina iki 99 % kenksmingų bakterijų. „Reach" dantų siūlas padės puoseleti švarius tarpdančius.

SU ŠEPETĖLIU TIK PUSĖ DARBO – NAUDOK IR „LISTERINE".

Perkant pakuotę – antra tokia pati DOVANŲ!

1+1

ZYLIA

ZYLIA WHITENING, dantų pasta suaugusiesiems, 75 ml
ZYLIA PARODONT, dantų pasta suaugusiesiems, 75 ml

BURNOS HIGIENOS PRIEMONĖS

„Zylia Whitening" – nepriekaištingai jūsų burnos higienai. Efektyviai mažina apnašas, balina dantis ir suteikia jiems blizgesio bei gaivų burnos kvapą.
„Zylia Parodont" – parodontozės pažeistų dantų ir jautrių dantų profilaktikai. Su žagreniais, ramunėlėmis, dilgelėmis ir čiobreliais.

Perkant pakuotę – antra tokia pati DOVANŲ!

1+1

ORALFLUX

BURNOS HIGIENOS PRIEMONĖS

Priemonių „Oralflux" veiksmingumas stiprinant dantų emalį įrodytas klinikiniais tyrimais. Reguliariai naudojamas „Oralflux" saugo nuo eduonies. **Be alkoholio ir parabenų.** Inovatyvus dozatorius užtikrina tikslią skalavimo skysčio dozę ir ekonomišką naudojimą. „Oralflux" turėtų būti naudojamas kaip pagalbinė priemonė valant dantis. Naudojimas: norėdami gauti 10 ml skysčio, švelniai paspauskite butelį, kol skystis atsiras virš purškimo prietaiso. Skalaukite burną skysčiu apie 1 min., išspjaukite. Kad poveikis būtų geresnis, nevalgykite ir negerkite 2 val. po skalavimo.

STIPRESNI DANTYS. GAIVESNIS KVAPAS. PLATESNĖ ŠYPSENA!

Nuolaidos galioja su vaistinės lojalumo kortelėmis.

IKI -40 %

IR GINTARINE.LT

PLEISTRAI AMEDIPLUS

IKI -20 %

IR GINTARINE.LT

PRIEMONĖS SLAUGAI

SENI

SENI sauskelnės ir sauskelnės kelnaitės – orui laidžios, su kvapo kontrolės sistema.
SENI apsauginiai paklotai – tai papildoma apsauga, kuri išsaugo švarią patalynę.
SENI kosmetika odos priežiūrai – nuvalo, naikina kvapus, maitina ir apsaugo odą nuo dirginklių.
*Sauskelnėms negalioja nuolaida su kompensuojamų vaistų pasu.

ESAME SU TAIS, KURIEMS MŪSŲ REIKIA

-20 %

IR GINTARINE.LT

MOTERŲ INTYMIAI HIGIENAI

MULTI-GYN

KOSMETIKOS IR MEDICINOS PRIEMONĖS

Mūsų produktai suteikia tinkamą intymią higieną ir padeda sumažinti nemalonius pojūčius toje srityje: nepageidaujamą kvapą, niežulį ar deginimo pojūtį. „Multi-Gyn" puikiai supranta moterų poreikius, kai atsiranda nepatogumų intymioje zonoje ir kaip tai paveikia jūsų gyvenimą. Todėl mes siūlome produktus, kurie gydo šiuos negalavimus natūraliu būdu, be žinomo šalutinio poveikio („Actigel", „Liquigel", „Flora Plus"). Visų produktų sudėtyje esantis unikalus 2QR* kompleksas atkuria ir normalizuoja natūralių makšties mikroflorą. * 2QR kompleksas – patentuoti biologiškai aktyvūs polisacharidai, gaunami iš sudedamųjų alavijų (Barbadensis Miller) medžiagų. www.2QR.com

JEI NORI BŪTI TIKRA DĖL SAVO SVEIKOS MAKŠTIES!

IKI -35 %

IR GINTARINE.LT

CONFIDENCE IN TEXTILES
Tested for harmful substances according to Oeko-Tex® Standard 100
20150K0784 AITEX
ECO Certified

MOTERS HIGIENAI

LADY ANION

Lady ANION higieniniai paketai ir įklotai su ekologiška medvilne ir anijonine juostele yra sertifikuoti pagal visuotinai pripažintą ekologinį standartą Oeko-Tex 100®.
Pantiliner (24 vnt. ir 48 vnt.) – ploni įklotai / kasdieniniam naudojimui.
Dayliner (16 vnt.) – įklotai su sparneliais gausioms išskyroms, negausioms menstruacijoms.
Active (15 vnt.) – įklotai su sparneliais, idealiai tinka keliaujant, sportuojant, šokant, nėštumo ar menopauzės metu.
Day Use (10 vnt. ir 20vnt.) – paketai dienai menstruacijų metu.
Night Use (8 vnt.) – paketai nakčiai menstruacijų metu.

-15 %

IR GINTARINE.LT

AUSŲ SIERAI SUMINKŠTINTI IR IŠVALYTI

VAXOL ausų purškalas 10 ml

MEDICINOS PRIETAISAS

„Vaxol" – tai saugus ir veiksmingas būdas suminkštinti ir natūraliai išvalyti ausų sierą: sušvelnina, drėkina ir natūraliai šalina ausų sierą. Tinka vaikams nuo 1 metų, greitai ir lengvai naudojamas. Sumažina ausies praplovimo švirkštu poreikį. Ypač patariama naudoti užsiimantiems vandens sportu, dažnai naudojantiems ausinukus, klausos aparatus, taip pat vyresnio amžiaus žmonėms.

AUSŲ PURŠKALAS SU ALYVUOGIŲ ALIEJUMI

-40 %

IR GINTARINE.LT

ASMENINEI MOTERS HIGIENAI

BELLA

HIGIENOS PRIEMONĖS

Higieniniai įklotai ir paketai „Bella Medica" – impregnuoti antibakteriškai veikiančiu žaliosios arbatos ekstraktu. Moterų higienos priemonės „Bella Herbs" su vaistinėmis liepžiedžių, verbenosų ir gysločių žolelėmis. Dar daugiau sugeriantys, su kvapo kontrolės sistema, laidūs orui. Ir nepamirškite vatos gaminių „Bella Cotton" - iš 100 % medvilnės!

KAI PAGALVOJI, TAI „BELLA"!

-30 %

IR GINTARINE.LT

CINKO KREMAS 24 ml
Minkština, ramina ir saugo sudirgintą odą, džiovina spuogus.

MEDETKŲ TEPALAS 30 g
Ramina, maitina ir saugo odą.
Naudoti tik išoriškai.

-30 %

IR GINTARINE.LT

ETERINIAI ALIEJAI

Skirti išoriniam naudojimui

ARBATMEDŽIO ALIEJUS, 10 ml, 30 ml
Tinka inhaliacijoms, masažams, kompresams bei vonelėms.

EUKALIPTŲ ALIEJUS, 10 ml, 30 ml
Gali būti naudojamas inhaliacijoms, vonioms ir masažams, pirtyse.

KĖNIŲ ALIEJUS, 10 ml, 30 ml
Rekomenduojama naudoti pirtyse ir voniose – aromatizuoti juo patalpas.

Gintarinė vaistinė

RANKŲ DEZINFEKANTAMS IR APSAUGINĖMS VEIDO KAUKĖMS

IKI -30%

Pasiūlymas galioja **2021 01 01–2021 01 31**, perkant vaistinėje, pateikus GINTARINĖS vaistinės ar MYLIMIAUSIA korteles. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui.

-40%

~~9,95 €~~

5,97 €

Atnaujinta pakuotė

AMBIO Multivitaminai nėščiosioms ir maitinančioms, 30 tablečių

MAISTO PAPILDAI

- Foliatai padeda palaikyti motinos audinių augimą nėštumo metu, padeda palaikyti normalią kraujodarą;
- Riboflavinas, tiaminas, niacinas, vitaminas B6, vitaminas B12, biotinas ir magnis padeda palaikyti normalią nervų sistemos veiklą;
- Foliatai, riboflavinas, niacinas, pantoteno rūgštis, vitaminas B6, vitaminas B12 ir magnis padeda mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį;

-50%

~~6,98 €~~

3,49 €

AMBIO MULTIVITAMINAI VAIKAMS 150 ml sirupas

MAISTO PAPILDAS

Vitaminas C padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą. Vitaminas A ir riboflavinas padeda išsaugoti normalų regėjimą. Vitaminas B_6 ir niacinas padeda palaikyti normalią psichologinę funkciją. Tiaminas padeda palaikyti normalią širdies veiklą. Kalcis reikalingas normaliai kaulų būklei palaikyti. Vitaminas D_3 padeda palaikyti normalią dantų būklę. Vartojimas: vaikams nuo 3 m. gerti po 2 arbatinius šaukštelius (10 ml), suaugusiesiems ir vyresniems nei 12 m. vaikams gerti po 15 ml (3 arbatinius šaukštelius) 1 kartą per dieną. Prieš vartojimą suplakti.

-12%

Vitabalans Kids

MAISTO PAPILDAI

Vitabalans Kids produktų linija yra maisto papildai vaikų gerai savijautai ir imuninės sistemos veiklai palaikyti. Švelnaus medaus skonio Hot Honey Kids, tai milteliai šiltam gėrimui ruošti su vitaminu C, medumi ir cinku, kurie tinka vaikams nuo 1 metų. Produkto sudėtyje nėra laktozės ir gliuteno. Vartoti po 1-3 paketėlius per dieną. Braškių-avietėlių skonio Lacto Seven Kids sudėtyje yra skirtingų pieno rūgšties bakterijų bei vitamino D ir jis tinkamas vaikams nuo 3 metų. Produkto sudėtyje nėra cukraus, laktozės bei gliuteno ir tinkamas veganams. Vartoti po 1 tabletę per dieną. Pagaminta Suomijoje.

-35%

~~6,99 €~~

4,54 €

Atnaujinta pakuotė

AMBIO CALCIUM FOR KIDS 100 ml

MAISTO PAPILDAS

Skystasis maisto papildas. Kalcis, vitaminas D_3, L-lizinas. Maisto papildo sudėtyje esantis kalcis reikalingas normaliai kaulų ir dantų būklei palaikyti.

Kalcis padeda palaikyti:
- normalią energijos apykaitą;
- normalią raumenų veiklą, normalų nervų impulso perdavimą;
- normalią virškinimo fermentų veiklą;
- normalų kraujo krešėjimą.

Vitaminas D padeda palaikyti:
- normalų kaulų ir dantų būklę bei normalią raumenų funkciją;
- normalią imuninės sistemos veiklą;
- normalią kalcio koncentraciją kraujyje;
- normalią kalcio ir fosforo absorbciją ir (arba) įsisavinimą.

Nurofen Forte

NUROFEN FORTE ORANGE 40 mg/ml geriamoji suspensija 100 ml 8,99 €

NUROFEN FORTE STRAWBERRY 40 mg/ml geriamoji suspensija 100 ml 8,99 €

NERECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI

1 ml geriamosios suspensijos yra 40 mg ibuprofeno. **Terapinės indikacijos:** trumpalaikis silpno ir vidutinio skausmo malšinimas. Trumpalaikis karščiavimo mažinimas. **Dozavimas ir vartojimo metodas:** naudojant pakuotėje esantį dozavimo švirkštą dozuoti, kaip nurodyta toliau: sveriantiems daugiau nei 5 kg (3-5 mėn.) kūdikiams gerti po 1,25 ml 3 kartus per parą, 7 - 9 kg (6 - 11 mėn.) kūdikiams – po 1,25 ml 3–4 kartus per parą, 10 - 15 kg (1 - 3 metų) vaikams – po 2,5 ml 3 kartus per parą, 16 - 19 kg (4 - 5 metų) vaikams – po 3,75 ml 3 kartus per parą, 20 - 29 kg (6 - 9 metų) vaikams – po 5 ml 3 kartus per parą, 30 - 40 kg (10 - 12 metų) vaikams – po 7,5 ml 3 kartus per parą.

NUO

5,99 €

Nurofen Orange 100 mg kramtomosios minkštosios kapsulės 12 kapsulių 5,99 €

NERECEPTINIS VAISTINIS PREPARATAS

Kiekviename kramtomajame minkštajame kapsulėje yra 100 mg ibuprofeno.
Terapinės indikacijos. Skirtas karščiavimo mažinimui, peršalimo ir gripo simptomų, silpno ar vidutinio stiprumo skausmo, tokio kaip gerklės, dantų, ausies, galvos, nedidelio maudimo ir pasitempimo, malšinimui. **Dozavimas ir vartojimo metodas.** Vartoti per burną ir tik trumpai.
Vaikams, sveriantiems 20–29 kg (7-9 metų) po 2 kapsules 3 kartus per parą. Vaikams, sveriantiems 30–40 kg (10-12 metų) po 3 kapsules 3 kartus per parą. Jei reikia, dozės turėtų būti skiriamos maždaug kas 6-8 valandas (mažiausias laiko tarpas tarp dozių yra 6 valandos). Prieš nurijant, vaistą reikia sukramtyti. Užsigerti vandeniu nereikia.
Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas ibuprofenui arba bet kuriai vaisto pagalbinei medžiagai; jei praeityje yra buvę padidėjusio jautrumo reakcijų (astma, rinitas, angioneurozinis patrinkimas, dilgelinė) vartojant ibuprofeną, kitą nesteroidinę vaistą nuo uždegimo (NVNU), įskaitant ir acetilsalicilo rūgšties darinius; anksčiau buvęs su NVNU vartojimu susiję kraujavimas iš virškinimo trakto ar virškinimo trakto perforacija; aktyvi ar anksčiau buvusi pasikartojantį pepsinę opa arba opos kraujavimas (du ar daugiau atskirų patvirtintų opos susidarymo ar kraujavimo epizodų); kraujavimas į smegenis arba kitokas kraujavimas; sunkus kepenų, inkstų arba širdies nepakankamumas; neaiškios kilmės kraujodaros sutrikimai; paskutinis nėštumo trimestro laikotarpis; jeigu pasireiškė sunki dehidratacija (dėl vėmimo, viduriavimo ar nepakankamo skysčių kiekio).
Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės: vaistų reikia atsargiai vartoti pacientams, sergantiems sistemine raudonoja vilklige, taip pat kurie serga mišria jungiamojo audinio liga, nes didėja aseptinio meningito rizika; kuriems yra įgimtas porfirino metabolizmo sutrikimas (pavyzdžiui, ūminė intermisinė porfirija), virškinimo trakto sutrikimų ir lėtinės uždegiminės žarnyno ligos (opinis kolitas, Krono liga), serga vėjaraupiais; jei anksčiau buvo padidėjęs kraujospūdis ir (arba) širdies nepakankamumas, yra inkstų, kepenų veiklos sutrikimas; iškart po dideles apimties chirurginės operacijos; jei yra širdies, nosies polipai arba lėtinių obstrukcinių kvėpavimo sutrikimų; jei anksčiau buvo pasireiškusių alerginių reakcijų į kitas medžiagas, nes dėl to padidėja alerginių reakcijų pasireiškimo rizika vartojant šiuos vaistus. Retai pastebėta sunkių odos reakcijų (kai kurios iš jų buvo mirtinos), įskaitant eksfoliacinį dermatitą, Stivenso-Džonsono (Stevens-Johnson) sindromą ir toksinę epidermio nekrolizę. Gauta pranešimų apie ūminės generalizuotos egzanteminės pustulozės (ŪGEP) atvejus, pasireiškusius vartojant ibuprofeno sudėtyje turinčius vaistinius preparatus. Pasireiškus pirmiesiems sunkių odos reakcijų požymiams ir simptomams, pavyzdžiui, odos išberimui, gleivinės pažeidimams ar kitiems padidėjusio jautrumo požymiams, ibuprofeno vartojimą reikia nutraukti. Šie vaistai gali būti susijęs su nedideliu širdies priepuolio (miokardo infarkto) ar insulto pavojaus padidėjimu. Nurofen Forte Orange ir Nurofen Forte Strawberry geriamosios suspensijos negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas retas paveldimas sutrikimas – fruktozės netoleravimas. Geriamųjų suspensijų sudėtyje yra skystojo maltitolio, kuris gali truputį laisvinti vidurius. Nurofen Orange negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas retas paveldimas sutrikimas – gliukozės ir galaktozės malabsorbcija. Taip pat šio vaisto negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas retas paveldimas sutrikimas – fruktozės netoleravimas, gliukozės ir galaktozės malabsorbcija arba sacharazės ir izomaltazės stygius. Reklamos tekstas parengtas 2020-09-23.

WWW.GINTARINE.LT

Daugiau nei 10 000 prekių asortimentas.

Pristatymas į namus arba paštomatus.**

Greitas ir nemokamas prekių pristatymas į daugiau nei 360 vaistinių.*

Konsultacijos ir pagalba nemokamu telefonu 8 800 10008.

Gintarinė vaistinė

INTERNETE

*Nemokamai pristatome į pasirinktą Gintarinę arba Norfos vaistinę.
**Nemokamai pristatome į namus, perkant už 29€ ir daugiau. Į namus nepristatomi vaistai ir prekės, perkamos su kompensuojamuoju receptu.